



Minőségét megőrzi (nap/hónap/év)
a doboz alján feltüntetett időpontig:

0
hó +



Szenzitív
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Nettó tömeg: **600 g (1x600 g) e**



0
hó +

Szenzitív
Enyhe emésztési problémák
esetén

Speciális – gyógyászati
célra szánt – tápszer



Lactofidus™ +

- Fermentációs eljárás
- scGOS/lcFOS

600 g e

Tápanyagok	100 g tápszerpor	100 ml 13,5%-os tápszeroldat
Energia	2045 kJ / 488 kcal	275 kJ / 66 kcal
Zsír	25,1 g	3,4 g
ebből telített zsírsav	10,3 g	1,4 g
egyszeresen telített zsírsav	9,5 g	1,3 g
többzörösen telített zsírsav	5,1 g	0,6 g
linolsav	3,36 g	0,454 g
α-linolénsav	0,622 g	0,084 g
Szénhidrát	53,7 g	7,3 g
ebből cukrok	53,5 g	7,2 g
glükóz	1,7 g	0,2 g
laktóz	51,1 g	6,9 g
Élelmi rost	4,2 g	0,6 g
Fehérje	9,8 g	1,3 g
tejsavó fehérje	4,9 g	0,7 g
kazein	4,9 g	0,7 g
Só	0,34 g	0,045 g
Vitaminok		
A-vitamin (RE)	391 µg	53 µg
D-vitamin	8,7 µg	1,2 µg
E-vitamin (TE)	8,1 mg	1,1 mg
K-vitamin	38 µg	5,1 µg
C-vitamin	68 mg	9,2 mg
B1-vitamin	0,37 mg	0,05 mg
B2-vitamin	0,83 mg	0,11 mg
Niacin	3,2 mg	0,43 mg
B6-vitamin	0,26 mg	0,04 mg
Folsav	96 µg	13 µg
B12-vitamin	1,3 µg	0,18 µg
Biotin	1,2 µg	1,6 µg
Pantoténsav	2,39 mg	0,32 mg
Ásványi anyagok		
Nátrium	134 mg	18 mg
Kálium	490 mg	66 mg
Klorid	290 mg	39 mg
Kalcium	335 mg	45 mg
Foszfor	239 mg	32 mg
Magnézium	38 mg	5,1 mg
Vas	3,9 mg	0,52 mg
Cink	3,6 mg	0,49 mg
Réz	0,3 mg	0,04 mg
Mangán	0,05 mg	0,01 mg
Fluorid	≤ 0,02 mg	≤ 0,003 mg
Szén	11 µg	1,5 µg
Jód	89 µg	12 µg
Nukleotidok		
Citidin-5-monofoszfát	8,1 mg	1,1 mg
Uridin-5-monofoszfát	5,7 mg	0,77 mg
Adenozin-5-monofoszfát	4,9 mg	0,67 mg
Guanozin-5-monofoszfát	1,7 mg	0,23 mg
Inozin-5-monofoszfát	3,3 mg	0,45 mg
Egyéb		
L-karnitin	9,6 mg	1,3 mg
Kolin	73 mg	9,9 mg
Inozitol	27 mg	3,7 mg
Taurin	39 mg	5,3 mg

Galakto- és frukto-oligoszacharidok (scGOS/lcFOS): 0,8 g/100 ml

Összetevők:
Sovány tejpor, növényi olajok (pálma-, repce-, kókusz-, napraforgó-, egysejtű olajok), laktóz (tejből), demineralizált savófehérje (tejből), galakto-oligoszacharid (tejből), nem demineralizált savófehérje (tejből), savófehérje koncentrátum (tejből), frukto-oligoszacharid, hálólag, emulgeálószer (szójalecitin), kalcium-karbonát, trikálium-citrát, magnézium-klorid, aszorbinsav, citromsav, taurin, kálium-klorid, nátrium-L-aszorbát, kolin-klorid, nátrium-hidroxid, kalcium-hidroxid, DL-alfa-tokoferele-acetát, vas-szulfát, nikotinamid, L-tryptofán, fitomenadion, cink-szulfát, kolekalciferol, retinil-acetát, uridin-5-monofoszfát, nátrium sója, citidin-5-monofoszfát, kolin-citrát, inozin-5-monofoszfát, aszorbil-palmitát, adenozin-5-monofoszfát, inozin-5-monofoszfát, nátrium sója, kalcium D-pantoténát, guanozin-5-monofoszfát, nátrium sója, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, cianokobalamin, pterilmonoglutaminsav, réz-szulfát, riboflavin, D-biotin, retinil-palmitát, DL-alfa-tokoferele, mangán-szulfát, kálium-jodid, nátrium-szelenit, tejtej, szájtej, halat tartalmaz.

Származási hely: Lengyelország
Forgalmazza: NÜMIL Kft.
1135 Budapest, Róbert K. lrt. 82-84.

600 g e

A Milupa Szenzitív részlegesen fermentált tápszer tartalmaz. A fermentáció során az alapanyagokhoz B. breve és S. thermophilus baktériumokat adunk, melynek hatására a tejfehérje szerkezete a tejjavas erjedés hatására megváltozik. A tápszer fermentáltságának köszönhetően javasoljuk hasfájásra, puffadásra, szorulásra hajlamos csecsemőknek.

Alkalmazási terület: a Milupa Szenzitív tápszer a tejfehérje lebontásával kapcsolatos enyhe emésztési nehézségek esetén (hasfájás, puffadás, szorulás) javasolt.



A Lactofidus™ + formula magában foglalja a fermentációs eljárást, valamint oligoszacharidok (scGOS és lcFOS) hozzáadását.

Fontos figyelmeztetés:

- A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej. A legegészségesebb táplálási mód a szoptatás.
- A Milupa Szenzitív csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Az orvosi előírástól, vagy a használati utasítástól eltérő alkalmazása zavart okozhat a csecsemő fejlődésében.
- A helytelen elkészítési mód, a nem ivóvíz minőségű víz használata, vagy az előírásból eltérő hígítás a csecsemő egészségét veszélyeztetheti.
- A Milupa Szenzitív speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer, 6 hónapos korig kizárólagos táplálékként is alkalmazható, ezt követően vegyes táplálékkal kiegészítve, tejtáplálékként használható.
- A tápszer parenterálisan nem alkalmazható.
- A tápszer gyermekektől elzárva tartandó.

Hasznos tanácsok a biztonságos használatához:

- A tápszer minden étkezéshez frissen készítsd el, és babád fogyassza el egy órán belül. Ne használj fel megmaradt tápszeroldatot.
- Védőgázás csomagolásban. Felbontás után a zacskót jól lezárva szárazon, szobahőmérsékleten tárold, ne tedd hűtőszekrénybel.
- A doboz tartalmát felbontás után 4 héten belül használd fel.
- Etetés után fontos a baba fogainak ápolása már az első fogak megjelenésétől, különösképpen az utolsó étkezés után.
- A tápszeres üveget nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni. A mikrohullámok különböző elnyelődése miatt a tápszer egyenlőtlenül melegszik fel.

Ingyenes Tanácsadás

06 80 33 12 33

milupa@milupa.hu
www.milupa.hu

Védőgázás csomagolásban.
Felbontás követően a doboz tartalmát 4 héten belül használd fel!
A tápszer gyermekektől elzárva tartandó!
A megbontott csomag száraz, hűvös helyen (< 25 °C, de nem hűtőben) tárolandó.



A tápszer elkészítése:

- 1 Moss kezet és fertőtlenítsd a cumisüveget és cumit, vagy az itatópharagot és egy kanalat forrásban lévő vízben.
- 2 Forrald fel a megfelelő mennyiségű vizet, majd hűtsd le kb. 40 °C-ra.
- 3 Öntsd a felforralt és lehűtött vizet 2/3-át a cumisüvegbe.
- 4 Kizárólag a dobozban található adagolókanalat használd! A mérésnél mindig simítsd le késsel az adagolókanálban lévő tápszerport.
- 5 A fertőtlenített cumisüvegbe vagy itatóphárba mérd ki a tápszerport (az adagolási táblázat szerinti) és rázd jól össze (kb. 20 másodpercig).
- 6 Öntsd hozzá a maradék vizet, zárd le a cumisüveget, majd óvatosan rázd össze újra. Itatóphár esetén, tedd a tápszerport az itatóphárba, kevés vízzel keverd csomómentesre, majd öntsd hozzá a maradék vizet, és jól keverd el.
- 7 Ellenőrizd a tápszeroldat hőmérsékletét (kb. 37 °C).

Adagolási javaslat:

Életkor	Ivóvíz (ml)	Adagoló kanalak száma	Kész tápszer	Napi ajánlott tejalapu étkezések száma*
0-14 nap	60	2	≈ 67 ml	7
2-4 hét	90	3	≈ 100 ml	6
1-2 hónap	120	4	≈ 130 ml	6
3-6 hónap	120	4	≈ 130 ml	5-6

A Milupa Szenzitív tápszer standard hígítása:
3 adagolókanál (13,5 g) + 90 ml ivóvíz = 100 ml kész tápszer
1 lesimított adagolókanál: ≈ 4,5 g tápszerpor
1 doboz Milupa Szenzitív tápszerporból 4,44 tápszer készíthető el.
* A Milupa Szenzitív tápszer napi mennyiségét az életkor és a testsúly figyelembevételével a kezelőorvos állapítja meg.

211 183
624028
PDS: 0129464-02-0002

000320000915_v3 FB 140x72x193 GD2 400G



000320000915_v3 FB 140x72x193 GD2 400G