

hake® Mix

ÚJ



cisztás fibrózis terápiájában!

NUTRICIA Scandishake® Mix



Speciális gyógyászati célra szánt ételmszer betegséghez kapcsolódó malnutrió, felszívódási zavarok, vagy egyéb állapotok diétás ellátására, ahol zsír/szénhidrát kiegészítés szükséges, beleértve a cisztás fibrózist. Enterális táplálásra. Kizárólag orvosi felügyelet mellett adható. Kizárólagos táplálásra nem alkalmas.

Használati utasítás

- 1 tasak por (85 g) 240 ml teljes tejben oldandó fel.
- Az elkészült adagot 2 órán belül el kell fogyasztani, vagy maximum 24 óráig hűtőszekrényben tárolható. A maradékot mindig dobja el.
- A felbontott tasak hűvös, zárt helyen tárolandó és felhasználandó 2-3 napon belül.
- Felhasználás előtt alaposan felrázandó.

Adagolás

- 3-5 éves kor: ½ tasak + 240 ml teljes tej
- 5-10 éves kor: 1 adag (=1 tasak + 240ml teljes tej)
- 10 éves kortól: 1-2 adag

Amennyiben az orvos vagy dietetikus másképp nem ajánlja.

Indikációk

- **Cisztás Fibrózis** (mucoviscidosis)

Kontraindikációk

- Tehéntejfehérje allergia
- Szondatáplálás és parenterális táplálás
- 3 éves kor alatt nem adható

Fontos információ

A termék laktózt tartalmaz. Laktóz intolerancia esetén, kérjük, kísérelje figyelemmel az enzimpótlást, a tolerancia mértékétől függően.

Ref: 1. Turck D, Braegger C. P., Colombo C. et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clinical Nutrition. 2016;35(3);557-577

Nutricia támogatott készítmény	Kiszerezési egység	Bruttó fogyasztói ár (Ft)*	Támogatási kategória (%)*	Emelt támogatási összeg (Ft)*	Térítési díj (FT)*	Indikációs pont*
Scandishake Mix Ízesítetlen	6 x 85 g	6864 Ft	90%	6178 Ft	686 Ft	EÜ 90 27.

*PUPHA törzs (www.neak.gov.hu), 2019.10.01.

Ezen információs anyag egészségügyi szakemberek számára készült. A NUMIL Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért. Jelen kiadvány elválaszthatatlan részét képezi a címkeszöveg. A felírási segédlet kizárólag a speciális ételmszer jogszabályoknak megfelelő támogatással való rendelését szolgálja, és segítséget nyújt a speciális ételmszer rendelésére jogosultnak a vényen feltüntetendő adatokról, és a rendelkezés jogcíméről.



Hideg italok esetében ajánlott összerázni shakerrel. Meleg italok készítésekor alaposan keverjük el, míg teljesen feloldódik.



Top Tipp!

Keverjen el 1 adag Scandishake Mix-et (85 g) 240 ml teljes tejjel, majd használja az aznapi kávéhoz, müzlihez, leveshez vagy szószokhoz. Ez majdnem 600 kcal-t és 12 g fehérjét fedez.

Scandis



Új lehetőség a táplálás

ÚJ LEHETŐSÉG A CISZTÁS FIBRÓZIS TÁPLÁLÁSTERÁPIÁJÁBAN!



AZ ESPEN-ESPGHAN-ECFS ajánlása a cisztás fibrózisos gyermekek és felnőttek táplálására¹

A cisztás fibrózisos betegek esetében a malnutróció rizikója elérheti az 50%-t.¹

50%
malnutróció rizikó

A cisztás fibrózisos gyermekek és felnőttek napi energiaszükséglete akár 110-200%-kal nagyobb lehet, mint egészséges társaiké.¹

110-200%
napi energiaszükséglet

Az ESPEN-ESPGHAN-ECFS ajánlása szerint **táplálásterápiát a diagnózist követően minél hamarabb el kell kezdeni.**¹

A Scandishake Mix megfelelő választás a cisztás fibrózisban szenvedő betegek tápláltsági állapotának javítására

- Magas energiatartalmú (**586 kcal /1 adag** teljes tejjel) a megnövekedett igény kielégítésére
- Polimer fehérjét tartalmaz, melynek **kedvezőbb az íze** a hidrolizált fehérjéhez hasonlítva
- Semleges ízének köszönhetően különböző **ételekhez és italokhoz egyaránt hozzáadható**

Kiszerezés

- 6 x 85 g (tasak)
- **Adagonként csomagolva** az egyszerű felhasználás és szállíthatóság érdekében



Gluténmentes



Hozzáadott szacharózt nem tartalmaz



Felírói kör

- Gasztroenterológus
- Gyermekek gasztroenterológus
- Tüdőgyógyász
- Gyermekek tüdőgyógyász
- Házi orvos (javaslatra írható)

Felírási segédlet

EÜ. emelt	X	Pulv. Scandishake Mix 6 x 85 g Scat Orig. No. quinque (V)
Nem helyettesíthető	X	D.S.: 1 tasak /nap 30 napra ellátva

