



EGYEDI SZAKÉRTELEM

TÁPANYAGTÁBLÁZAT



FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Milumil® AR optima

Standard hígítás: Mellékelt adagolókanál lesimítva = 4,5 g tápszerpor
3 lesimított adagolókanál (13,37 g) tápszerpor + 90 ml ivóvíz = 100 ml kész tápszer

Életkor	Ajánlott tejalapú étkezések száma naponta	Ivóvíz (ml)	Adagolókanalak száma	Kész tápszer
1-2 hét	gyermekorvosal, védőnővel való megbeszélés alapján			
3-4 hét	6-7	90	3	100 ml
1-2 hónap	6	120	4	133 ml
3-4 hónap	5-6	150	5	167 ml
5-6 hónap	5-6	180	6	200 ml
6-7 hónap	naponta 3-4x	180	6	200 ml
8-9 hónap	naponta 2-3x	210	7	233 ml
10-12 hónap	naponta 2x	240	8	267 ml

Fontos figyelmeztetés!

- A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej, a legegészségesebb táplálási mód a szoptatás.
- Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, kérj meg a gyermekorvost, védőnőt a tápszer használatáról!
- A termék kizárólag az orvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a használati utasítás szerint alkalmazható. Az orvos előírásaitól vagy a használati utasítástól eltérő alkalmazása zavart okozhat a csecsemő fejlődésében!

A tápszer elkészítése

- 1 Moss kezet, forrásban lévő vízben fertőtlenítsd a cumisüveget, a cumit és mindig tiszta adagolókanalat használj. A tápszer állaga a megszokottnál sűrűbb, ezért segíthet, ha változtható átfolyású cumit választunk.
- 2 Forrald fel a szükséges mennyiségű ivóvizet, majd hűtsd le kb. 40 °C-ra, és öntsd 1/3 részét a cumisüvegbe.
- 3 Mérd ki a cumisüvegbe a tápszerport (az adagolási táblázat szerint), zárd le és rázd jól össze (kb. 20 másodpercig).
- 4 Öntsd hozzá a maradék vizet, majd óvatosan rázd össze újra, és hagyd állni a tápszeroldatot (kb. 7 percig), hogy besűrűsödjön.
- 5 Ellenőrizd a tápszeroldat megfelelő hőmérsékletét (kb. 37°C).

Gyermekek egészségének érdekében gondosan ügyelj a következőkre:

- A termék 6 hónapos korig egyedüli táplálékforrásként, 6 hónapos kor után vegyes táplálékkal kiegészítve alkalmazható.
- A tápszer minden étkezéshez frissen készítsd el, és 2 órán belül használd fel.
- A melegítéshez ne használj mikrohullámú sütőt a túlforrósodás veszélye miatt.
- Figyeld arra, hogy babád mindig felhőtlen felülete mellett igyon, illetve egyen, és etetés után gondoskodj a fogápolásról.
- A Milumil® AR optima parenterálisan nem adható, illetve nem alkalmazható tejfehérje-allergia, laktóz-intolerancia, galaktokémiá, glükóz-galaktóz malabszorpció, valamint hal- és szójaallergia esetén!

Milumil.

AR OPTIMA

BUKÁS diétás ellátására

900 g e (2x450 g)

Milumil®

AR OPTIMA

BUKÁS diétás ellátására

✓ Szentjánoskenyér-maggal sűrített formula Újszülött kortól

SPECIÁLIS GYÓGYÁSZATI CÉLRA SZÁNT ÉLELMISZER
Orvosi ellenőrzés mellett használható

900 g e (2x450 g)

Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): ▲



a bélflóra egészségéről

A NUTRICIA tapasztalata a csecsemőtáplálás területén már 120 évnél is régebbre nyúlik vissza. Több mint 500 elkötelezett kutatónk és szakértőnk 40 éve élén jár a kutatásban.

A babák gyakran visszaakadnak kis mennyiségű tejet etetés után (ezt általában bukásnak nevezzük). Néhány csecsemő azonban gyakori bukástól szenved.

Kutatásunk tette lehetővé, hogy létrehozzuk a Milumil® AR optima termékünket, mely egy komplett tápanyagforrás kifejezetten azon csecsemők és kisdetek számára kifejlesztve, akiknél gyakori bukás tapasztalható.

A Milumil® AR optima nem alkalmas koraszülött csecsemők táplálására.

Milumil® AR optima: speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer

Egyedi összetételünk tartalmaz:



✓ A szentjánoskenyér-mag egy természetes sűrítőanyag: a benne található természetes rostok úgy sűrítik a formulát, hogy megkötik annak víztartalmát, ezzel segítve a táplálék gyomorban maradását. Ez a bukás diétás ellátásának alapvető eleme.

Fordulj hozzánk bizalommal!

Ha kérdésed van kisgyermeked táplálásával, fejlődésével, vagy a Milumil® termékek használatával kapcsolatban, bátran hívd munkatársunkat!

☎ 06 80 33 12 33

Ingyenes zöldszám

✉ mlumil@mlumil.hu

🌐 www.mlumil.hu

Védőgáz csomagolásban. Minőségét megőrzi (nap, hónap, év); a doboz alján feltüntetett időpontig. Tárolás: száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) szorosan visszazárva.

A megbontott dobozt 4 hétnél tovább ne használj! A termék gyermekektől elzárva tárolandó.

Származási hely: EU
Forgalmazó: Numil Kft.
1134 Budapest, Váci út 35.



10366537
647723
0123125-01-0003