330 mm

113 mm ±0.5

TÁPANYAGTÁBLÁZAT

Átlagos értékek 100 ml tápszerelőállításban (13,8 g por)	
Energia	**270 kJ / 64 kcal**
Zsír	**3,4 g**
amelyből:	
- telített zsírsav	1,2 g
- egyszeresen telítetlen zsírsav	1,6 g
- többszörösen telítetlen zsírsav	0,5 g
amelyből: "nyomjelző zsírsavak",	
többszörösen telítetlen zsírsavak (LCP)	
– linolsav (LA)	428 mg
– alfa-linolénsav (ALA)	59 mg
– arachidonsav (AA)	16,5 mg
– dokozahexaénsav (DHA)	16,5 mg
Szénhidrátok	**7,2 g**
amelyből cukrok	7 g
– glükóz	0,32 g
– laktóz	6,75 g
– inozit	7,5 mg
Fehérjék	**1,5 g**
Só	**0,4 g**
Vitaminok	
A-vitamin	50 µg
D3-vitamin	1,45 µg
E-vitamin	1,2 mg TE
K-vitamin	2,4 µg
C-vitamin	8,6 mg
Tiamin (B1)	0,06 mg
Riboflavin (B2)	0,08 mg
Niacin (B3)	0,42 mg
Pantoténsav (B5)	0,32 mg
B6-vitamin	0,039 mg
Folát	7 µg
B12-vitamin	0,11 µg
Biotin	1,3 µg
Ásványi anyagok	
Nátrium	33 mg
Kálium	88 mg
Klorid	58 mg
Kalcium	60 mg
Foszfor	32 mg
Magnézium	5,7 mg
Vas	0,55 mg
Cink	0,48 mg
Réz	0,052 mg
Mangán	0,004 mg
Fluorid	4,1 µg
Szelén	2,8 µg
Jód	11 µg
Nukleotidok	**2,3 mg**
Citidin-5'-monofosfát	0,77 mg
Uridin-5'-monofosfát	0,37 mg
Adenozin-5'-monofosfát	0,48 mg
Guanozin-5'-monofosfát	0,27 mg
Inozin-5'-monofosfát	0,32 mg
Egyéb	
L-karnitin	1,7 mg
Kolin	24 mg
Taurin	5,3 mg
Nukleotamentes szénhidrát (GOS)	0,2 g

ÖSSZETEVŐK

Laktóz (tehérjegy(ek)), **fajtaszerű fehérje-hidrolizátum** (tehérjegy(ek)), növényi olajok (magas oléipartartalmú napraforgóolaj, kokuszolaj, repceolaj, napraforgóolaj), galakto-oligoszacharidok (tehérjegy(ek)), emulgeálószerek (szójalecitin, mono- és diglicseridekből származó észterek, lecitinek), fruktó-oligoszacharidok, **hal**olaj, trikálcium-foszfát, dikálium-hidrogén-foszfát, magnézium-klorid, Mortierella alpina olaj, kolin-klorid, nátrium-klorid, kálium-klorid, L-szőlőcukorsav, inozit, taurin, DHA-szőlőcukorban termő M. fungi, kálium-citrát, vas-szulfát, cink-szulfát, L-karnitin, kalcium-klorid, uridin-5'-monofosztát nátrium sója, citidin-5'-monofosztát, antioxidáns (ascorbinil-palmitát), adenozin-5'-monofosztát, kalcium-D-pantoténsát, inozin-5'-monofosztát nátriumsója, nikotinamid, DL-alfa-tokoferil-acetát, guanozin-5'-monofosztát nátriumsója, réz-szulfát, ciboflávin, retinil-palmitát, tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, retinil-acetát, kálium-jodid, pteroilmonoglutamátsav, mangán-szulfát, nátrium-szelenit, fitomenadion, D-biotin, kobalt(II)-klorid, cianokobalamin.

Allergiát okozó anyagok: tisztaságban kisnyelve.

Forgalmazza: Danone Kft.
1054 Budapest, Váci út 55.

NUTRICIA

Milumil®

SYNEO-BIOTIK

50 év KUTATÁS A CSECSEMŐK TÁPLÁLÁSÁBAN

Életkorra szabott összetétel hidrolizált fehérjével

PROSYNEO HA*

Teljes értékű táplálék**

Omega-3 (DHA)**

START

0 HÓ+

TEJLAPÚ ANYATEJ-HELYETTESÍTŐ TÁPSZER

400 g e

*Hidrolizált anyatej-helyettesítő

**Az anyatej-helyettesítő tápszerekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

STANDARD HIGÍTÁS

1 lesimított adagolókanál = 4,6 g tápszerpor
3 lesimított adagolókanál (13,8 g) tápszerpor + 90 ml vízvitz = 100 ml kész tápszer

Életkor	Ajánlott tejalapú étkezések száma naponta	Ivóvíz (ml)	Adagolókanalak száma	Kész tápszer
	gyermekorvossal, védőnővel való megbeszélés alapján			
1–2 hét	6–7	90	3	100 ml
1–2 hónap	6	120	4	133 ml
3–4 hónap	5–6	150	5	167 ml
5–6 hónap	5–6	180	6	200 ml

6 hónapos koron túli ajánlott mennyiségről konzultáljon gyermekorvossal vagy védőnővel!

A TÁPSZER ELKÉSZÍTÉSE

1. Mosson kezet, forralja (kevi) vízben fertőtlenítsen a csomagolást, a szeret, és mindig tiszta adagolókanalat használjon! 2. Forralja fel a szükséges mennyiségű vizet, majd hűtse le kb. 40 °C-ra, és öntsd 1/3 részét a csecsemőüvegbe! 3. Mérd ki a mindenkor elő tápszerport az adagolókanálban (szerint), ürítsd, majd rázd ki az üveg alá. Zárd az üveget, majd 4. Öntsd hozzá a maradék vizet, majd rázd és ezután ajánlott a tápszerport az adagolókanálban (lásd. 3.)*!

GYERMEKED EGÉSZSÉGÉNEK ÉRDEKÉBEN GONDOSAN ÜGYELJ A KÖVETKEZŐKRE:

- A Milumil® HA Start Prosyneo tápszer 0-hónapos korig használható egyedül tápanyagforrásként.
- 3 hónapos kor után a lejalapú táplálék csak részét képezhető a változatos étrendnek. Mindig étkezéshez friss vizet készítsd el a tápszert, és annyit vagy legfeljebb 2 órán belül használd fel, a maradékot dobd el. Szándékos ügyelj a megfelelő higiénára, és sohsz mindenkor azzal használd!
- A mellékelt adagolókanalat használd a tápszerpor kimérésehez! Ne Tartsd fel a tápszerdobozt, és ne használj mikrohullámsütőt szárítás mikrohullámban; vagy az elektromos/ne a tűzforrásokba, vezetve mártt!
- A mesterséges sárcsiítsége a tápszerben tartalmazó lítikbacterium breve baldrnumokat. Ügyelj arra, hogy kabát mindig tehetőt tekgyeszte mellett igaza, illetve egyen, és ebben utan gyermekedet a fogogadásnál!
- A tápszer nem okozhatsszár: szójafehérje-allergia, laktóz-intolerancia, galaktozémia, galaktóz-galaktóz malabszorpció, valamint hal- és szójaallergia esetén!
- Milumil® HA Start Prosyneo tápszer a fehérjebontott típusban bekontrált formulákat tartalmazza, ezért ízt és szerszerkötése eltérhet a szokásos tejalapú tápszerekétől.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

- A szeretetű legjobb táplálékja az anyatej, a legegészségesebb tápláláson mód szoptatás.
- Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, kérdezd meg a gyermekorvost, védőnőt a termék használatáról!
- Ne tárj el az orvos ellátásától, illetve a használati utasításától, mert ez zavart okozhat kisbabád fejlődésében!

A terméket gyermekedtől elzárva tárold! Mindvégigt megírt (nap, hónap, év) a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot szárazz, hűvös helyen (nem hűtőben, +25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd a felnőtt ételt tovább! Widegtas csomagolásban.

Kisbabád megérkezésével egy különleges időszak veszi kezdetét, mely egyszerre gyönyörű, eseménydús és bizony olykor kihívásokkal teli. Mi ebben az időszakban szeretnénk ott lenni melletted.

Szakértőink tapasztalatát és kutatási eredményeit felhasználva alkottuk meg legújabb formulánkat, így magabiztos lehetsz, ha kisbabád táplálásáról van szó.

50 — év — kutatás a csecsemőtáplálásban

Milumil®
SYNEO-BIOTIK

Kutatókból és szakértőkből álló csapatunk 50 éve foglalkozik a csecsemőkori táplálással, hogy megértsük, miként tudjuk a babák fejlődését a legjobban támogatni. Ez alapján alkották meg a Milumil® HA Start Prosyneo-t kisbabád táplálkozási igényeire szabva.

TELJES ÉRTÉKŰ TÁPLÁLÉK*

SYNEO®
50 év kutatási tapasztalat

Hidrolizált fehérje
Kíméletes eljárással kisebb egységekre bontott fehérje.

DHA (Omega-3)*

*Az anyatej-helyettesítő tápszerekre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően.

HA KÉRDÉSED LENNE, HÍVD SZAKÉRTŐINKET SZEMÉLYRE SZABOTT TANÁCSOKÉRT!

Ingyenesen hívható telefonszámunk: **06 80 33 12 33**
milumil@milumil.hu
www.milumil.hu

miluklub
www.miluklub.hu

EZ A DOBOZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ

Válaszd szét a fémdobozt a műanyag tetőtől, és dobd mindegyiket szelektív hulladékgyűjtőbe!

5 900852 036514

TULAJDON-01-0003
0040895
0030895

400 g e

PL 16616001 WE

DANONE

000330002444_v3_LB ADHESIVE LABEL 99 MM CAN 330X113

SGS&CO
49, BD DU GÉNÉRAL MARTIAL VALIN
75015 PARIS
TÉL : +33 (0)1 45 58 80 00

Code GPAO **381638**
10/12/2021

version 2 Repro

Danone SN
Nutricia
Project **2101389**
Mat. code **10414936**

Project : 2101389.003_HU_Milumil Start_Prosyneo_TIN_HA_400g_10414936
Sub Brand : Milumil
Category : Milks
Country : ELN
Factory : Opole
Barcode : 5900852036514
Cutterguide N° : 000330002444_v3.pdf
Profile : Fogra 39 L
Corporate Code : 665165
previous Mat. code : 10354451
Printer : Unilogo
Printing Process : Digital
Material Type : Can_Tin
2D code : _

PANTONE Reflex Blue C	Cyan	Magenta	Yellow	Kontúrvonal
8,2 %	53,6 %	1,5 %	0,1 %	