

Super Soluble Duocal speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer.

Felhasználható betegségek diétás ellátására, ahol magas energia- és alacsony folyadékbevitel indokolt, így vese és májbetegségekben és katabolikus stressz esetén. A zsír és szénhidrát kiegyensúlyozott keveréke. Tehéntejfehérje mentes. **Fontos figyelmeztetések:** Csak szoros orvosi felügyelet mellett alkalmazható. Adható csecsemőknek, gyermekeknek és felnőtteknek. Nem alkalmas kizárólagos táplálásra. Parentálisan nem alkalmazható **Összetevők:** szárított glükóz szirup, közepes szénláncú trigliceridek (pálmamag és/vagy kókuszolaj), porsáfrányolaj, kanolaolaj, emulgeálószer (E472c). **Nettó tömeg: 400g. Átlagos tápérték/100g por** Energia 2061 kJ/492 kcal, Zsír 22,3g amelyből Telített zsírsavak 10,4g, Egyszeresen telítetlen zsírsavak 9,0 g, Többszörösen telítetlen zsírsavak 2,9 g, amelyből linolsav 2,31 g, alfa-linolénsav 0,49 g, LA:ALA arány 4,71:1, LCT 13,8 g, MCT 8,5 g. Szénhidrát 72,7g, amelyből Cukrok 6,5g, Rost 0g, Fehérje 0g, Só <0,05g, Vitamin: E-vitamin 2,9 mg (alfa TE), Ásványi anyagok: Nátrium <20mg, Kálium <5mg, Klorid <20mg, Kalcium <5mg, Foszfor <5mg, Magnézium <5mg, Mennyiségét orvosnak vagy dietetikusnak kell meghatároznia, napi mennyiség függ az életkortól, a testtömegetől és a beteg egészségi állapotától. Semleges ízének köszönhetően hozzáadható más italokhoz, ízesíthető gyümölcsökkel, különböző más ételekkel; felhasználható tej helyettesítésére, valamint csecsemőtápszerhez is adható.

Elkészítés:

Hígítás	víz mennyisége (ml)	teljes térfogat (ml)	por (g)	kcal/ml	Osmolalitás (mOsmol/kg víz)
1:04	150	176	37,5	1,05	196
1:03	150	188	50	1,3	310
1:2*	150	205	75	1,8	525

* standard hígítás 1:2.

1. Mérje ki a szükséges mennyiségű port. Egy 2,5 ml-es kanál kb 1,2 g port tesz ki. A szükséges mennyiségű tápszerport mérje ki. 2. Adja a port a szükséges mennyiségű vízhez, majd egy villával keverje addig, míg a por fel nem oldódik a vízben. Csecsemőtápszerhez adás esetén kövesse a szigorú higiénias utasításokat, elkészítés után 2 órán belül használja fel. A javasolt mennyiség 1g por/100ml csecsemőtápszer. **Tárolás:** Száraz, hűvös helyen tartandó. Felnyitás után doboz tetejét mindig szorosan zárja vissza. Első felnyitástól számított négy héten belül fel kell használni. Védőgáz csomagolásban. A dentálhigiéna fontos a csecsemőknél és gyermekeknél, mivel a fog hosszantartó speciális élelmiszerekkel való érintkezése növeli a fogszuvasodás kockázatát. **Minőségét megőrzi:** a doboz alján látható időpontig. Gyártja: **SHS International Ltd.** Egyesült Királyság Infóvonal: 06 80 223 223 Forgalmazza **Danone Kft.** 1134 Budapest, Váci út 35. www.nutricia.hu **Cimkékód:** HU117547/11/03/2022



5 016533 634877