

## MMA/PA Anamix Infant speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer

Metilmalonsav- vagy propionsav-acidémia diétás ellátására csecsemőknek 12 hónapos korig, kiegészítő táplálásként 3 éves korig. Egy aminosav alapú, metionin-, treonin- és valinmentes por és alacsony izoleucin tartalommal, esszenciális és nem-esszenciális aminosavakkal,

szénhidrát-, zsír-, vitamin-, ásványi anyag- és nyomelem tartalommal. **Nettó tömeg:**

**3x400 g. Fontos figyelmeztetés:** Kizárólag enterális táplálásra, parentálisan nem alkalmazható. Csak orvosi ellenőrzés mellett adható. Csak metilmalonsav- vagy propionsav acidémiában adható. Kizárólagos fehérjeforrásként nem adható, javasolt más fehérjeforrással együtt adni, pl. anyatejjel, csecsemő tápszerrel vagy más fehérjeforrással, hogy a csecsemő/gyermek metionin, treonin, valin, izoleucin, folyadék és általános tápanyagszükségletét a szakorvos vagy dietetikus javaslatának megfelelő mennyiségben fedezze. **Adagolás:** a mennyiséget és a hígítás mértékét az orvosnak és a dietetikusnak kell megállapítania, amely függ a beteg életkorától, testsúlyától és az egészségi állapotától. **Javasolt koncentráció:** Minden csapott adagolókanálnyi (5 g) porhoz 30 ml víz szükséges a javasolt koncentráció eléréséhez (15 % w/v, pl. 15 g por 100 ml-ig vízzel felöntve) ahol az ozmolalitás: 380 mOsmol/kg víz. **Elkészítés:** A CSECSEMŐ EGÉSZSÉGE FÜGG AZ ELŐKÉSZÍTÉSRE ÉS ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK PONTOS BETARTÁSÁTÓL. A HELYTELEN ELKÉSZÍTÉS ÁRTHAT A CSECSEMŐ EGÉSZSÉGÉNEK. 1. Az elkészítés előtt mosson kezet és tisztítsa meg a környezetét. Sterilizálja a cumisüveget és a cumit. 2. Forraljon friss vizet 5 percig, majd hagyja hűlni legalább 30 percig, amíg a csuklóján még melegnek érzi. A szükséges mennyiségű vizet töltsse a sterilizált cumisüvegbe. 3. Az adagolókanállal mértesen a porból, majd egy tiszta, száraz késsel simítsa le a kanál tetejét. Ne nyomkodja az adagolókanálba a port. Csak a termékben található adagolókanál használható fel az elkészítéshez. 4. Adja a szükséges mennyiségű port a vízhez. Tegye vissza a cumisüveg tetejét, majd rázza, amíg a por fel nem oldódik. Az etetés előtt győződjön meg róla, hogy az elkészített oldat hőmérséklete megfelelő, tegyen pár cseppet a csuklójára. 5. Közvetlen elkészítés után használja fel. A cumisüvegben megmaradt, elkészített oldatot az etetés után 1 órával dobja ki. Ne melegítse újra az etetés alatt. Fontos figyelmeztetés:

A por nem steril. Az etetés előtt mindig frissen készítse el az oldatot. Ne forralja és ne használjon mikrohullámú sütőt az elkészítéséhez vagy melegítéséhez. **Kérjük, hogy vigyázzon gyermeke fogainak egészségére!** Cumisüveggel történő etetés esetén ne hagyja, hogy az üveg hosszú ideig vagy gyakran érintkezzen a csecsemő vagy a kisgyermek fogzatával, mivel ezzel növelheti a fogbetegségek kialakulásának kockázatát. Győződjön meg róla, hogy gyermekének fogai meg lettek tisztítva az esti etetés után. Kérdéseivel, tanácsért forduljon fogorvosához. **Átlagos tápérték:** 100 g porban (100 ml 15%/v-os kész oldatban) **Energia:** 1950 kJ/466 kcal (293 kJ/70 kcal), **Zsír** 23g (3,5 g), amelyből telített zsírsavak 7,7 g (1,2 g), egyszerűen telítetlen zsírsavak 11,3 g (1,7 g), többszörösen telítetlen zsírsavak 4,0 g (0,6 g), amelyből linolsav 3,21 g (481 mg),  $\alpha$ -linolénsav 0,32 g (47,6 mg), arachidonsav 0,12 g (17,8 mg), dokozahexaénsav 0,12 g (17,8 mg), **Szénhidrát** 50,1 g (7,5 g) amelyből cukrok 7,5 g (1,1 g), Rost 3,7 g (0,56 g), **Fehérje ekvivalens** 13,1 g (2,0 g), amelyből L-alanin 1,60 g (240 mg), L-arginin 1,40 g (210 mg), L-aszparaginsav 1,27 g (191 mg), L-cisztn 0,51 g (76,5 mg), L-glutaminsav 1,59 g (239 mg), L-glutamin 0,13 g (19,5 mg), Glicin 0,64 g (96 mg), L-hisztidin 0,94 g (141 mg), L-izoleucin <0,045 g (<6,75 mg), L-leucin 2,12 g (318 mg), L-lizin 1,43 g (215 mg), L-metionin – g\* (- mg\*), L-fenilalanin 0,93 g (140 mg), L-prolin 0,64 g (96,0 mg), L-szerin 0,89 g (134 mg), L-treonin – g\* (- mg\*), L-triptofán 0,41 g (61,5 mg), L-tirozin, 0,93 g (140 mg), L-valin – g\* (- mg\*), **Só** 0,48 g (0,07 g), **Vitaminok:** A-vitamin 408  $\mu$ g (61,2  $\mu$ g), D-vitamin 11,2  $\mu$ g (1,68  $\mu$ g), E-vitamin 9,23 mg TE, 11,5 mg (1,38 mg TE, 1,73 mg), C- vitamin 48,9 mg (7,34 mg), K-vitamin 37,3  $\mu$ g (5,59  $\mu$ g), Tiamin 0,51 mg (0,08 mg), Riboflavin 0,51 mg (0,08 mg), Niacin 2,33 mg NE, (0,35 mg), B6-vitamin 0,51 mg (0,08 mg), Folsav 55,0  $\mu$ g (8,25  $\mu$ g), Folát 91,7  $\mu$ g (13,8  $\mu$ g), B12-vitamin 1,21  $\mu$ g (0,18  $\mu$ g), Biotin 18,2  $\mu$ g (2,73  $\mu$ g), Pantoténsav 2,81 mg (0,42 mg), **Ásványi anyagok és nyomelemek:** Nátrium 191 mg (28,7 mg), Kálium 505 mg (75,8 mg), Klorid 355 mg (53,3 mg), Kalcium 410 mg (61,5 mg), Foszfór 300 mg (45,0 mg), Magnézium 58,3mg (8,75 mg), Vas 7,92 mg (1,19 mg), Réz 0,42 mg (0,063 mg), Cink 5,59 mg (0,84 mg), Mangán 0,029 mg (0,004 mg), Jód 97,9  $\mu$ g (14,7  $\mu$ g), Molibdén 12,1  $\mu$ g (1,82  $\mu$ g), Szelén 17,7  $\mu$ g (2,66  $\mu$ g), Króm 14,0  $\mu$ g (2,10  $\mu$ g), Egyéb: L-karnitin 10,1 mg (1,52 mg), Kolin 146 mg (21,9 mg), Inozitol 97,9 mg (14,7 mg), Taurin 30,0 g (4,50 mg) \* nincs hozzáadva. **Összetevők:** szárított glükózszirup, növényi olajok (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj, kókuszolaj, repcemagolaj, napraforgó olaj), galakto-oligoszacharidok (**tehéntejből**), L-lizin-L glutamát, L-leucin, L-alanin, L-arginin, L-aszparaginsav, emulgeálószer (zsírsavak mono és diszacharidjainak citromsav észterei), L-hisztidin, kalcium-foszfát, L-tirozin, L-fenilalanin, L-szerin, kálium-citrát, glicin, L-prolin, fruktooligoszacharidok, L-cisztn, kálium-klorid, L-triptofán, kolin-bitartarát, magnézium-acetát, kalcium-glicerofoszfát, nátrium-hidrogén-foszfát, olaj Crypthocodium cohnii-ből, olaj Mortierella alpina-ből, nátrium-klorid, L-glutamin, inozitol, L-glutaminsav, L-aszkorbinsav, antioxidánsok (napraforgó lecitin, aszkorbil-palmitát), taurin, vas-szulfát, cink-szulfát, L-karnitin, DL- $\alpha$ -tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, nikotinamid, réz-szulfát, tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, retinil-acetát, kálium-jodid, mangán-szulfát, pteroilmonoglutaminsav, króm-klorid, fitomenadion, nátrium-szelenit, nátrium-molibdát, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin. **Minőségét megőrzi:** lásd a doboz oldalán. **Tárolás:** Száraz, hűvös helyen tartandó. Felbontás után a doboz tetejét mindig szorosan zárja vissza, felbontás után két hétig használható fel. Védőgáz csomagolásban **Gyártja:** SHS International Ltd., Egyesült Királyság.

**Forgalmazza:** Danone Kft. 1134 Budapest, Váci út 35. [www.nutricia.hu](http://www.nutricia.hu) Címkekód:



HU646553/20/06/2023 Infóvonal: 0680 223 223 5 016533 655803