

ÖSSZETEVŐK

Maltodextrin, hidrolizált savófehérje koncentrátum (tejből), növényi olajok (pálma-, repce-, kókusz-, napraforgó-, egysejtű olaj), galakto-oligoszacharid (tejből), trikálcium-foszfát, emulgeálószer (mono- és digliceridek citromsav észtere), frukto-oligoszacharid, kálium-klorid, trinátrium-citrát, halolaj, magnéziumhidrogén-foszfát, kalcium-karbonát, nátrium-klorid, kolin-klorid, L-askorbinsav, taurin, nátrium-L-askorbát, vas-szulfát, inozitol, DL-alfa-tokoferil acetát, cink-szulfát, uridin-5'-monofoszfát nátrium sója, citidin-5'-monofoszfát, L-karnitin, adenozin-5'-monofoszfát, inozin-5'-monofoszfát nátrium sója, nikotinamid, kalcium-D-pantotenát, guanozin-5'-monofoszfát nátrium sója, D-biotin, réz-szulfát, pterilmonoglutaminsav, retinil-palmitát, DL-alfa-tokoferol, riboflavin, cianokobalamin, biotin-hidroklorid, kolekalciferol, piridoxin-hidroklorid, kálium-jodid, mangán-szulfát, fitomenadion, nátrium-szele-nit. **Allergének:** összetevőlistában kiemelve

Fontos figyelmeztetés!

• A Milumil Pepti Junior vegyes étrend részeként adható 12 hónapos kor után. Egyedüli tápanyagforrásként nem használható, parenterálisan nem adható.
• A termék kizárólag az orvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a használati utasítás szerint alkalmazható. Az orvos előírásától vagy a használati utasítástól eltérő alkalmazás zavart okozhat a kisgyermek fejlődésében.

TÁPANYAGTÁBLÁZAT

Átlagos értékek 100 ml italban (14 g por)

Energia	278 kJ 66 kcal	B ₆ -vitamin Folsav	0,04 mg 8,3 µg
Zsírok	3,05 g	B ₁₂ -vitamin Biotin	0,18 µg 1,96 µg
amelyből:		Ásványi anyagok	
telített zsírsav	1,39 g	Nátrium	25 mg
egyszeresen telítetlen zsírsav	1,15 g	Kálium	76 mg
többszörösen telítetlen zsírsav	0,5 g	Klorid	41 mg
amelyből: hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak (LCP)		Kalcium	61 mg
- Linolsav (LA)	0,4 g	Foszfor	36 mg
- Alfa-linolénsav (ALA)	0,07 g	Magnézium	5,3 mg
Szénhidrátok	7,9 g	Vas	0,99 mg
ebből cukrok	3,5 g	Cink	0,49 mg
- glükóz	0,32 g	Réz	0,04 mg
- laktóz	2,84 g	Mangán	0,01 mg
- maltóz	0,32 g	Szelén	1,19 µg
poliszacharid	4,31 g	Jód	12 µg
Élelmi rost	0,56 g	Nukleotidok	3,22 mg
Fehérje	1,57 g	Citidin-5'-monofoszfát	1,06 mg
amelyből:		Uridin-5'-monofoszfát	0,76 mg
- tejsavófehérje	1,57 g	Adenozin-5'-monofoszfát	0,66 mg
Só	0,06 g	Guanozin-5'-monofoszfát	0,22 mg
		Inozin-5'-monofoszfát	0,45 mg
Vitaminok		Egyéb	
A-vitamin	57 µg-RE	L-karnitin	1,19 mg
D ₂ -vitamin	1,39 µg	Kolin	9,9 mg
E-vitamin	1,1 mg α-TE	Inozitol	3,2 mg
K-vitamin	4,9 µg	Taurin	5,2 mg
C-vitamin	9 mg	GOS (galakto-oligoszacharidok)	0,70 g
Tiamin (B ₁)	0,05 mg	FOS (frukto-oligoszacharidok)	0,08 g
Riboflavin (B ₂)	0,11 mg		
Niacin (B ₃)	0,87 mg-NE		
Pantoténsav (B ₅)	0,33 mg		

Fordulj hozzánk bizalommal!

Ha kérdésed van kisgyermeked táplálásával, fejlődésével, vagy a Milumil® termék használatával kapcsolatban, bátran hívd munkatársunkat!

☎ 06 80 33 12 33

ingyenes zöldszám

✉ milumil@milumil.hu

www.milumil.hu

NUTRICIA



PEPTI JUNIOR TEHÉNTJEFÉHÉRJE-ALLERGIA diétás ellátására

- ✓ Hipoallergén
- ✓ Extenzíven hidrolizált fehérje
- ✓ Oligoszacharid heverék

SPECIÁLIS - GYÓGYÁSZATI CÉLRA SZÁNT - TÁPSZER
ORVOSI ELLENŐRZÉS MELLETT HASZNÁLHATÓ

450g e

1 éves kortól

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Milumil® Pepti Junior

Életkor	Ajánlott tejalapú étkezések száma	Ivóvíz (ml)	Adagolókanalak száma	Kész ital
12-36 hónap	naponta 2x	225	7,5	250 ml

Standard hígítás: 1 lesimított adagolókanal = 4,67 g italpor.
3 lesimított adagolókanal (14 g) italpor + 90 ml víz = 100 ml kész ital.

Az ital elkészítése

- 1 Moss kezet, forrásban lévő vízben fertőtlenítsd az itatópoharat, és mindig tiszta adagolókanalat használj.
- 2 Forrald fel a szükséges mennyiségű ivóvizet, majd hűtsd le kb. 40 °C-ra, és öntsd 1/3 részét az itatópohárba.
- 3 Mérd ki az itatópohárba az italport (az adagolási táblázat szerint), zárd le, és rázd jól össze (kb. 20 másodpercig).
- 4 Öntsd hozzá a maradék vizet, majd óvatosan rázd össze újra.
- 5 Ellenőrizd az elkészített ital megfelelő hőmérsékletét (kb. 37°C).

Felhasználási ötletek: önálló italként, főzelékek habarásához vagy gyümölcsös turmixok készítéséhez.

Gyermeked egészségének érdekében gondosan ügyelj a következőkre:

- Az italt minden étkezéshez frissen készítsd el és 2 órán belül használd fel.
- Ne forrald fel az elkészített italt és ne használj mikrohullámú sütőt az elkészítéséhez vagy melegítéséhez a túlforrósodás veszélye miatt.
- Figyelj arra, hogy babád mindig felöltött felügyelete mellett igyon, illetve egyen, és etetés után gondoskodj a fogpolásról.

Védőgáz csomagolásban.

Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a doboz alján feltüntetett időpontig

Tárolás: száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C)

A megbontott dobozt 4 hétnél tovább ne használd!

A tápszer gyermekektől elzárva tárolandó.

EGYEDI SZAKÉRTELEM

A csecsemő- és kisdetáplálás területén végzett 40 évnyi kutatómunka eredményeként a NUTRICIA 400 kutatóból és szakértőből álló csapata megalkotta a **Milumil® Pepti Junior** formulát, mely összetétele úgy lett kialakítva, hogy hozzájáruljon kisgyermeked táplálkozási szükségleteinek biztosításához növekedésének minden szakaszában. Amennyiben gyermeked korábban is tejfehérje-allergia miatt diétás ellátásra szorult, úgy 12 hónapos kor után megoldás lehet a **Milumil® Pepti Junior** használata.

40
-év-
kutatás

a kisdetáplálásban

Milumil® Pepti Junior, speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer

Válogatott összetevők egyedi keveréke:



5 997672 305234

Származási hely: EU
Forgalmazó: Numil Kft.,
1134 Budapest, Váci út 35.

NL
20041
EC

450g e