

Milumil Nutriton O+

Széntjánoskenyérmag kivonatot tartalmazó sűrítőpor.

Speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer bukás, hányás, reflux és nyelési nehézség diétás ellátására.

A Milumil Nutriton azonnal oldódó sűrítő, amely

- könnyen oldódik – nem szükséges melegíteni
- gluténmentes
- tej- és laktózmentes

A Milumil Nutriton felhasználása:

A Milumil Nutriton speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer, a táplálék sűrűségét jelentősen növelő széntjánoskenyérmag kivonatot tartalmaz.

Alkalmazható tápszeroldatok, anyatej, és készételek sűrítésére vagy önmagában, gél formátumban kanállal adagolva az étkezések előtt vagy közben. Ajánlott rendszeres vagy visszaterő bukás, hányás, reflux és nyelési nehézség esetén.

Útmutató – hogyan készítsd el a Milumil Nutritont

Anyatej vagy tápszer sűrítése: egy nagyobb méretű cumisüvegbe beleöntjük az anyatejet vagy elkészítjük a tápszert a szokásos módon és megfelelő hőmérsékletre (lehetőleg 40 °C) hűtjük. Hozzáadjuk a Milumil Nutritont az orvos által előírt mennyiségben [a **standard hígítás alapesetben 1 adagolókanál sűrítőpor (1,7 g) + 100 ml anyatej/ tápszer**] és lezárjuk a cumisüveget. Függetlenül tartva, erős körkörös mozdulatokkal rázzuk 5 másodpercig. A sűrítőpor hozzáadása és a körkörös keverés között eltelt időt minimalizálni kell. Rázzuk a cumisüveget 20 másodpercig. 7 percig hagyjuk állni, hogy besűrűsödjön. Közvetlenül az etetés előtt fordítsuk lefelé a cumisüveget. A sűrű állag miatt közepes, vagy gyors átfolyású cumi használata javasolt.

Gél készítése (előzeteshez): 1 adagolókanálny Milumil Nutriton sűrítőport hozzáadunk **20-25 ml vízhez vagy anyatejhez** (annak hiányában tápszerhez). Jól felrázzuk (30-60 mp), majd 3-4 percig hagyjuk állni, hogy besűrűsödjön, majd ismét felrázzuk. Az elkészült gélből minden etetés (szoptatás vagy tápszeres) előtt kiskanállal adjunk a babának. Az elkészült gélből csak annyit adjunk, amennyit elfogad, illetve amekkora mennyiség adása már csökkenti a bukások számát, mértékét.

Sűrítőpor hozzáadás egyéb ételkezhz: a sűrítőport 1 adagolókanálny mennyiségben javasolt a baba ételéhez keverni (150-200 gramm ételhez). Ha túl sűrű állagú a pép, a baba nem szívesen fogadja el, akkor a sűrítőpor mennyiségét csökkentheted.

1 mérőkanál = 1,7 g. Mindig a dobozban található kanalat használjuk! Mindig frissen készítjük el a sűrített táplálékot, mert tárolás és hűtés esetén tovább sűrűsödhet.

Egyes esetekben az éretlenebb emésztőrendszerű babák kezdetben nehezebben emészthetik meg a poliszacharidokat tartalmazó sűrítőport. Rendszeres használata során a széklet besűrűsödhet, székrekedés léphet fel. Ez esetben csökkentsd az egyszerű adagot (csak fél mérőkanál sűrítőport használj), illetve javasolt a fokozott folyadékbevitel.

Ha ez nem vezet eredményre, jelezd a problémát a gyermekorvosnak!

Nettó tömeg: 135 g

A termék védőgáz csomagolásban van, lezárt állapotban száraz, hűvös helyen tárolod (<25°C, de nem hűtőben)!

Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): a doboz tetején feltüntetett időpontig.

Forgalmazó: Danone Kft. 1134 Budapest, Váci út 35.

Átlagos tápanyagértékek	100 g Nutriton porban	100 ml vízből készített Nutriton géliben (1,7 g porból)
Energia	1362 kJ/ 321 kcal	23 kJ/ 5 kcal
Zsír	0,3 g	
Szénhidrát	66,2 g	1,1 g
ebből cukrok	6 g	0,1 g
glükóz	1,3 g	
laktóz	<0,05 g	<0,001 g
maltóz	4,7 g	0,1 g
ebből poliszacharidok	60,2 g	1 g
Élelmi rost	25,1 g	0,4 g
Fehérje	1,6 g	
Só	<=0,01 g	
Ásványi anyagok		
Nátrium	<=5,4 mg	<=0,09 mg
Kálium	91 mg	1,5 mg
Klorid	109 mg	1,9 mg
Kalcium	335 mg	5,7 mg
Foszfor	12 mg	0,21 mg
Magnézium	9,1 mg	0,15 mg
Vas	8,8 mg	0,15 mg
Cink	5,3 mg	0,09 mg
Réz	0,121 mg	0,002 mg
Mangán	0,028 mg	

Összetétel: maltodextrin, széntjánoskenyérmag, kalcium-karbonát, vas-szulfát, cink-szulfát.

Gyermekek egészsége érdekében gondosan ügyelj a következőkre: • Minden étel, ital elkészítése előtt moss kezet és használj tiszta eszközöket. • A mellékelt adagolókanalat használj a Milumil Nutriton por kiméréséhez. • Figyelj arra, hogy babád mindig felnőtt felügyelete mellett igyon illetve egyen. • Etetés után gondoskodj a fogápolásról. • Az etetést követően a megmaradt gélt vagy a besűrített ételt már ne használj fel újra. • A felbontott csomagolást használj után gondosan zárd vissza, 4 hétnél ne használj tovább.

Fontra figyelmeztetés!

• A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej. A legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. • A Milumil Nutriton sűrítő kizárólag orvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a használati utasítás szerint alkalmazható. • A Milumil Nutriton újszülött kortól adható, elsődlegesen érett csecsemőknek javasolt, kizárólag gyermekorvos felügyelete mellett. Alkalmazása nem javasolt koraszülött és kis súlyú született csecsemők esetében. • A nem ivóvíz minőségű víz használata és az előírástól eltérő hígítás a csecsemő egészségét veszélyeztetheti. • A Milumil Nutriton kizárólagos táplálásra nem alkalmas. • A termék parenterálisan nem alkalmas. • A Milumil Nutriton gyermekektől elzárva tartandó.

Csak gyógyszerárban kapható!

PDS: 127700-01-0005