

KETOCAL 4:1 KETOCAL 4:1 KETOCAL 4:1 KETOCAL 4:1 KETOCAL 4:1 KETOCAL 4:1 KETOCAL 4:1 KETOCAL 4:1 KETOCAL 4:1 KETOCAL 4:1 KETO

HU **Figyelmeztetés:** Kérjük, kövesse figyelemmel a betegét hipoglycemia, vesebő, hiperlipidémia valamint a megfelelő növekedés tekintetében.

Javaslat adogatás: A napi mennyiséget és a higítás mértékét orvosnak vagy dietetikusnak kell megállapítania, az a mennyiség függ az a beteg életkorától, a testtölyétől és egészségi állapotától.
Javasolt higítás: 14,2 fertogat.% (pl.: 14,2 g por + 86 ml víz/12 = 100 ml elkészített oldat)
Az orvos az egyéni igények alapján magasabb koncentrációkat is előírhat.

Kerjeje össze a következő mennyiségeket a megfelelő koncentráció eléréséhez.

Higítás	Por	Ívóvíz	Elkészített mennyiség	Ozmolálítás
0,67 kcal/ml	95 g	91 ml	100 ml	110 mOsmol/kg H ₂ O
0,8 kcal/ml	114 g	89 ml	100 ml	130 mOsmol/kg H ₂ O
1,0 kcal/ml	142 g	86 ml	100 ml	170 mOsmol/kg H ₂ O
1,5 kcal/ml	21,3 g	79 ml	100 ml	260 mOsmol/kg H ₂ O

A ketogén diéta kezdetén, a magas zsírtartalom tolerálhatósága miatt, kevésbé koncentrárt vagy kisebb mennyiségű speciális élelmiszer bevitele lehet szükséges. Figyeljen arra, hogy a napi szükséges folyadékbevitel biztosított legyen.

Használati utasítás: Szonda - és íható tápláláshoz:

- Öntsze a megfelelő mennyiségű meleg vizet egy csavars fedélrel zárható edénybe. A port meleg vízzel (45-50°C) kell elkészíteni, hogy teljesen feloldódjon. Hőmérvével ellenőrizze a hőmérsékletet vagy 1:1 arányban keverjen össze frissen forrárt vizet hideg ivóvízzel a megfelelő hőmérséklet eléréséhez (közvetlenül ne használjon forró vizet a csapból).
- Mérje ki a szükséges mennyiségű port.
- Zárja le az edényt és addig rázza erősen, amíg teljesen feloldódik.
- Óvatosan távolítsa el a doboz fedelét. Igény esetén hűtse le hűtőszekrényben és 24 órán belül fogyassza el az elkészített oldatot.

Használati utasítások: Alaposan mosson kezet és tisztítsa meg a környezetét. Közvetlen használat előtt rázza fel vagy keverje össze a speciális élelmiszert. Az üledékes termékezes ezen speciális élelmiszer esetén. Szondatáplálás esetén öblítse át a szondát langyos ivóvízzel (körülbelül 37°C) a táplálás megkezdése előtt. Orális (íható) táplálás esetén a fogzászásra kész ítl lehúvna a legfontosab.

Tárolás: Száraz, hűvös helyen tartandó. Használat után mindig gondosan zárja vissza a fedelét. Felbontás után 1 hónapon belül felhasználandó. Védőgázos csomagolásban.

Összetevők: Növényi olajok (pálmaolaj, szójababolaj, napraforgóolaj), **tehenjtefehére** (kazein, tejsavó), szójalecetin, cellulóz, glükóz-szirup, inulin, kalcium-karbonát, kálium-klorid, oligofruktóza, gumiarabikum, trikálcium-foszfát, csomósodást gátló anyag (szilikium-dioxid), rezisztens keményítő, nátrium-klorid, kálium-citrát, kolin-bitarát, L-arginin, L-cisztin, olaj (Monterella Alpina-ból, olaj *Cryptocodinium cohnii*-ből, szója poliszacharid, magnézium-acetát, aroma, L-tryptofán, nátrium-kazeinát (**tehenjtejből**), nátrium L-aszorbát, maltodextrin, magnézium-oxid, L-fenilalanin, L-kamlin, L-aszorbinsav, taurin, vas-szulfát, L-valin, inozitol, L-tirozin, edesítőszer (szukralóz), emulgeálószer (zsírsavak mono és

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL 4:1

KETOCAL

Nährwerte proWartość odżywcza/ Διατροφικές Πληροφορίες/ Nutricióni infomace na / Výživové údaje na / Tápérték információ per					
	100 g	142 g Pulver/ proszku /yp avonyç/ prášku/or		100 g	142 g Pulver/ proszku /yp avonyç/ prášku /porban
Energie/Wartość energetyczna/ Ενέργεια/ Energetická hodnota/ Energia	2306 kJ /740 kcal	413 kJ /100 kcal		143 g	2,0 g
Fett/Τυσucz/ λίμν/ Τυκν/ Zsír	69,2 g	9,8 g		1,3 g	0,19 g
davon/ w tym/ εκ τωv onkov/ z toho/ amelyből					
- Gesättigte Fettsäuren/ Kwasy nasycone/ Κορεσμένα/ Nasyčené masné kyseliny/ Nasyténé masné kyseliny/ Teltelt zsírsavak	26,1 g	3,7 g		1,66 mg (α-TE/ET)	0,10 mg
- Einfach ungesättigte Fettsäuren/ Jedonienasycone/ Μονοκόρεστα/ Mononenasyčené masné kyseliny/ Mononenasyténé masné kyseliny/ Egyszeresen telítetlen zsírsavak	22,7 g	3,2 g	11,7 mg (α-TE/ET)	0,70 mg	0,12 mg
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren/ Wielonienasycone/ Πολυκόρεστα/ Polymenasyčené masné kyseliny/ Polymenasyténé masné kyseliny/ Többösen telítellen zsírsavak	20,4 g	2,9 g	0,70 mg		0,10 mg
– Arachidonsäure/ Kwias arachidonoy/ Αραχιδονικό οξύ/ Kyselina arachidonová/ AA/ Többösen telítellen zsírsavok	0,12 g	17,0 mg	0,87 mg		0,12 mg
– Arachidonsäure/ Kwias arachidonoy/ Αραχιδονικό οξύ/ Kyselina arachidonová/ AA/ Többösen telítellen zsírsavok			0,87 mg		0,12 mg
– Docosahexaensäure (DHA)/ Kwias dokozahexaenoy/ Δωκοζαεξωνικό οξύ (DHA)/ Kwias dokozahexaenová (DHA)/ Kyselina dokozahexaenová (DHA)/ Δωκοζαεξασäure	0,11 g	15,6 mg	0,87 mg		0,12 mg
(0,17 g/100 g Fettsäuren)/ (0,17 g/100 g kwasów tłuszczowych)/ (0,19 g/100 g λιπών οξέων)/ (0,19 g/100 g masnych kyseliny)/ (0,19 g/100 g masnych kyseliny) (0,19 g/100 g zsírsav)			0,87 mg		0,12 mg
– Docosahexaensäure (DHA)/ Kwias dokozahexaenoy/ Δωκοζαεξωνικό οξύ (DHA)/ Kyselina dokozahexaenová (DHA)/ Kyselina dokozahexaenová (DHA)/ Δωκοζαεξασäure			0,87 mg		0,12 mg
(0,17 g/100 g Fettsäuren)/ (0,17 g/100 g kwasów tłuszczowych)/ (0,19 g/100 g λιπών οξέων)/ (0,17 g/100 g masnych kyseliny)/ (0,17 g/100 g masnych kyseliny) (0,17 g/100 g zsírsav)			0,87 mg		0,12 mg
Mineralstoffe und Spurenelemente/ Στεκνάδι mineralne i pierwiastki śladowe/ Μέταλλα και ίχνοστοχία/ Mineralni látky a stopové prvky/ Minerálne látky a stopové prvky/ Ásványi anyagok és nyomelemek					
Na	529 mg	75,2 mg	Zn	4,40 mg	0,62 mg
K	855 mg	121 mg	Cu	0,55 mg	0,078 mg
Cl	800 mg	114 mg	Mn	0,44 mg	0,062 mg
Ca	780 mg	114 mg	Mo	31,7 μg	4,50 μg
P	462 mg	65,6 mg	Se	30,0 μg	4,26 μg
Mg	107 mg	15,2 mg	Cr	15,7 μg	2,23 μg
Fe	8,00 mg	1,14 mg	I	86,2 μg	12,2 μg
Wellere/Inne/ Aomó/ Jlné/ lné/ Eýgeb					
L-Camitin/ L-kamitina/ L-Kopimín/ L-kamitin/ Lkamitin				45,0 mg	6,39 mg
Cholin/ Cholina/ Xoλίν/ Cholin/ Kolin				324 mg	46,0 mg
Inositol/ Inozitol/ Iνωσινόλι/ Inozitol				221 mg	31,4 mg
Taurin/ Ταυρίνα/ Ταυρίνη/ Taurin				33,0 mg	4,69 mg
Sachardt/ Szénhidrát					
davon/ w tym/ εκ τωv onkov/ z toho/ amelyből					
- Zucker/ Cukor/ Zökyoroc/ Cukrok	0,68 g	0,10 g			
Ballaststoffe/ Βιομίν/ Εβδύουζ/ ινec/ Ψάκννα/ Rost	5,4 g	0,77 g			

digliceridej), cínk-szulfát, DL-α-tokoferol-acetát, nikotinamid, kalcium-D-pantoténát, réz-szulfát, piridoxin-hidroklorid, mangán-szulfát, kámin-hidroklorid, riboflavin, retinil-acetát, antioxidáns (aszorbil-palmitát, kevert tokoferolok), pteroil-monoglutaminsav, kálium-jód, króm-klorid, nátrium-selenit, nátrium-molibdát, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin.

Figyelmeztetés: Kérjük, kövesse figyelemmel a betegét hipoglycemia, vesebő, hiperlipidémia valamint a megfelelő növekedés tekintetében.

Javaslat adogatás: A napi mennyiséget és a higítás mértékét orvosnak vagy dietetikusnak kell megállapítania, az a mennyiség függ az a beteg életkorától, a testtölyétől és egészségi állapotától.
Javasolt higítás: 14,2 fertogat.% (pl.: 14,2 g por + 86 ml víz/12 = 100 ml elkészített oldat)
Az orvos az egyéni igények alapján magasabb koncentrációkat is előírhat.

Kerjeje össze a következő mennyiségeket a megfelelő koncentráció eléréséhez.

Higítás	Por	Ívóvíz	Elkészített mennyiség	Ozmolálítás
0,67 kcal/ml	95 g	91 ml	100 ml	110 mOsmol/kg H ₂ O
0,8 kcal/ml	114 g	89 ml	100 ml	130 mOsmol/kg H ₂ O
1,0 kcal/ml	142 g	86 ml	100 ml	170 mOsmol/kg H ₂ O
1,5 kcal/ml	21,3 g	79 ml	100 ml	260 mOsmol/kg H ₂ O

A ketogén diéta kezdetén, a magas zsírtartalom tolerálhatósága miatt, kevésbé koncentrárt vagy kisebb mennyiségű speciális élelmiszer bevitele lehet szükséges. Figyeljen arra, hogy a napi szükséges folyadékbevitel biztosított legyen.

Használati utasítás: Szonda - és íható tápláláshoz:

- Öntsze a megfelelő mennyiségű meleg vizet egy csavars fedélrel zárható edénybe. A port meleg vízzel (45-50°C) kell elkészíteni, hogy teljesen feloldódjon. Hőmérvével ellenőrizze a hőmérsékletet vagy 1:1 arányban keverjen össze frissen forrárt vizet hideg ivóvízzel a megfelelő hőmérséklet eléréséhez (közvetlenül ne használjon foró vizet a csapból).
- Mérje ki a szükséges mennyiségű port.
- Zárja le az edényt és addig rázza erősen, amíg teljesen feloldódik.
- Óvatosan távolítsa el a doboz fedelét. Igény esetén hűtse le hűtőszekrényben és 24 órán belül fogyassza el az elkészített oldatot.

Használati utasítások: Alaposan mosson kezet és tisztítsa meg a környezetét. Közvetlen használat előtt rázza fel vagy keverje össze a speciális élelmiszert. Az üledékes termékezes ezen speciális élelmiszer esetén. Szondatáplálás esetén öblítse át a szondát langyos ivóvízzel (körülbelül 37°C) a táplálás megkezdése előtt. Orális (íható) táplálás esetén a fogzászásra kész ítal lehúvna a legfontosab.

Tárolás: Száraz, hűvös helyen tartandó. Használat után mindig gondosan zárja vissza a fedelét. Felbontás után 1 hónapon belül felhasználandó. Védőgázos csomagolásban.

Összetevők: Növényi olajok (pálmaolaj, szójababolaj, napraforgóolaj), **tehenjtefehére** (kazein, tejsavó), szójalecetin, cellulóz, glükóz-szirup, inulin, kalcium-karbonát, kálium-klorid, oligofruktóza, gumiarabikum, trikálcium-foszfát, csomósodást gátló anyag (szilikium-dioxid), rezisztens keményítő, nátrium-klorid, kálium-citrát, kolin-bitarát, L-arginin, L-cisztin, olaj (Monterella Alpina-ból, olaj *Cryptocodinium cohnii*-ből, szója poliszacharid, magnézium-acetát, aroma, L-tryptofán, nátrium-kazeinát (**tehenjtejből**), nátrium L-aszorbát, maltodextrin, magnézium-oxid, L-fenilalanin, L-kamlin, L-aszorbinsav, taurin, vas-szulfát, L-valin, inozitol, L-tirozin, edesítőszer (szukralóz), emulgeálószer (zsírsavak mono és

L-arginin, L-Cystin, Ól as Monterella alpina, Ól as *Cryptocodinium cohnii*, Soja-Polysaccharide, Magnesiumacetat, Aroma, L-Tryptophan, Natriumcasein (aus Kuhmilch), Natrium-L-ascorbat, Maltodextrin, Magnesiumoxid, L-Phenylalanin, L-Camitin, L-Ascorbinsäure, Taurin, Eisensulfat, L-Valin, Inositol, L-Tyrosin, Süßholzwurzel (Suralose), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Zink-sulfat, DL-α-Tocopherylacetat, Niotinamid, Calcium-D-Pantothemat, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Mangansulfat, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, gemischte Tocopherole), Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Chrom(III)-chlorid, Natriumselenit, Natriummolibdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.

Figyelmeztetés: Kérjük, kövesse figyelemmel a betegét hipoglycemia, vesebő, hiperlipidémia valamint a megfelelő növekedés tekintetében.

Javaslat adogatás: A napi mennyiséget és a higítás mértékét orvosnak vagy dietetikusnak kell megállapítania, az a mennyiség függ az a beteg életkorától, a testtölyétől és egészségi állapotától.
Javasolt higítás: 14,2 fertogat.% (pl.: 14,2 g por + 86 ml víz/12 = 100 ml elkészített oldat)
Az orvos az egyéni igények alapján magasabb koncentrációkat is előírhat.

Kerjeje össze a következő mennyiségeket a megfelelő koncentráció eléréséhez.

Higítás	Por	Ívóvíz	Elkészített mennyiség	Ozmolálítás
0,67 kcal/ml	95 g	91 ml	100 ml	110 mOsmol/kg H ₂ O
0,8 kcal/ml	114 g	89 ml	100 ml	130 mOsmol/kg H ₂ O
1,0 kcal/ml	142 g	86 ml	100 ml	170 mOsmol/kg H ₂ O
1,5 kcal/ml	21,3 g	79 ml	100 ml	260 mOsmol/kg H ₂ O

A ketogén diéta kezdetén, a magas zsírtartalom tolerálhatósága miatt, kevésbé koncentrárt vagy kisebb mennyiségű speciális élelmiszer bevitele lehet szükséges. Figyeljen arra, hogy a napi szükséges folyadékbevitel biztosított legyen.

Használati utasítás: Szonda - és íható tápláláshoz:

- Öntsze a megfelelő mennyiségű meleg vizet egy csavars fedélrel zárható edénybe. A port meleg vízzel (45-50°C) kell elkészíteni, hogy teljesen feloldódjon. Hőmérvével ellenőrizze a hőmérsékletet vagy 1:1 arányban keverjen össze frissen forrárt vizet hideg ivóvízzel a megfelelő hőmérséklet eléréséhez (közvetlenül ne használjon foró vizet a csapból).
- Mérje ki a szükséges mennyiségű port.
- Zárja le az edényt és addig rázza erősen, amíg teljesen feloldódik.
- Óvatosan távolítsa el a doboz fedelét. Igény esetén hűtse le hűtőszekrényben és 24 órán belül fogyassza el az elkészített oldatot.

Használati utasítások: Alaposan mosson kezet és tisztítsa meg a környezetét. Közvetlen használat előtt rázza fel vagy keverje össze a speciális élelmiszert. Az üledékes termékezes ezen speciális élelmiszer esetén. Szondatáplálás esetén öblítse át a szondát langyos ivóvízzel (körülbelül 37°C) a táplálás megkezdése előtt. Orális (íható) táplálás esetén a fogzászásra kész ítal lehúvna a legfontosab.

Tárolás: Száraz, hűvös helyen tartandó. Használat után mindig gondosan zárja vissza a fedelét. Felbontás után 1 hónapon belül felhasználandó. Védőgázos csomagolásban.

Összetevők: Növényi olajok (pálmaolaj, szójababolaj, napraforgóolaj), **tehenjtefehére** (kazein, tejsavó), szójalecetin, cellulóz, glükóz-szirup, inulin, kalcium-karbonát, kálium-klorid, oligofruktóza, gumiarabikum, trikálcium-foszfát, csomósodást gátló anyag (szilikium-dioxid), rezisztens keményítő, nátrium-klorid, kálium-citrát, kolin-bitarát, L-arginin, L-cisztin, olaj (Monterella Alpina-ból, olaj *Cryptocodinium cohnii*-ből, szója poliszacharid, magnézium-acetát, aroma, L-tryptofán, nátrium-kazeinát (**tehenjtejből**), nátrium L-aszorbát, maltodextrin, magnézium-oxid, L-fenilalanin, L-kamlin, L-aszorbinsav, taurin, vas-szulfát, L-valin, inozitol, L-tirozin, edesítőszer (szukralóz), emulgeálószer (zsírsavak mono és

L-arginin, L-Cystin, Ól as Monterella alpina, Ól as *Cryptocodinium cohnii*, Soja-Polysaccharide, Magnesiumacetat, Aroma, L-Tryptophan, Natriumcasein (aus Kuhmilch), Natrium-L-ascorbat, Maltodextrin, Magnesiumoxid, L-Phenylalanin, L-Camitin, L-Ascorbinsäure, Taurin, Eisensulfat, L-Valin, Inositol, L-Tyrosin, Süßholzwurzel (Suralose), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Zink-sulfat, DL-α-Tocopherylacetat, Niotinamid, Calcium-D-Pantothemat, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Mangansulfat, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, gemischte Tocopherole), Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Chrom(III)-chlorid, Natriumselenit, Natriummolibdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.

Figyelmeztetés: Kérjük, kövesse figyelemmel a betegét hipoglycemia, vesebő, hiperlipidémia valamint a megfelelő növekedés tekintetében.

Javaslat adogatás: A napi mennyiséget és a higítás mértékét orvosnak vagy dietetikusnak kell megállapítania, az a mennyiség függ az a beteg életkorától, a testtölyétől és egészségi állapotától.
Javasolt higítás: 14,2 fertogat.% (pl.: 14,2 g por + 86 ml víz/12 = 100 ml elkészített oldat)
Az orvos az egyéni igények alapján magasabb koncentrációkat is előírhat.

Kerjeje össze a következő mennyiségeket a megfelelő koncentráció eléréséhez.

Higítás	Por	Ívóvíz	Elkészített mennyiség	Ozmolálítás
0,67 kcal/ml	95 g	91 ml	100 ml	110 mOsmol/kg H ₂ O
0,8 kcal/ml	114 g	89 ml	100 ml	130 mOsmol/kg H ₂ O
1,0 kcal/ml	142 g	86 ml	100 ml	170 mOsmol/kg H ₂ O
1,5 kcal/ml	21,3 g	79 ml	100 ml	260 mOsmol/kg H ₂ O

A ketogén diéta kezdetén, a magas zsírtartalom tolerálhatósága miatt, kevésbé koncentrárt vagy kisebb mennyiségű speciális élelmiszer bevitele lehet szükséges. Figyeljen arra, hogy a napi szükséges folyadékbevitel biztosított legyen.

Használati utasítás: Szonda - és íható tápláláshoz:

- Öntsze a megfelelő mennyiségű meleg vizet egy csavars fedélrel zárható edénybe. A port meleg vízzel (45-50°C) kell elkészíteni, hogy teljesen feloldódjon. Hőmérvével ellenőrizze a hőmérsékletet vagy 1:1 arányban keverjen össze frissen forrárt vizet hideg ivóvízzel a megfelelő hőmérséklet eléréséhez (közvetlenül ne használjon foró vizet a csapból).
- Mérje ki a szükséges mennyiségű port.
- Zárja le az edényt és addig rázza erősen, amíg teljesen feloldódik.
- Óvatosan távolítsa el a doboz fedelét. Igény esetén hűtse le hűtőszekrényben és 24 órán belül fogyassza el az elkészített oldatot.

Használati utasítások: Alaposan mosson kezet és tisztítsa meg a környezetét. Közvetlen használat előtt rázza fel vagy keverje össze a speciális élelmiszert. Az üledékes termékezes ezen speciális élelmiszer esetén. Szondatáplálás esetén öblítse át a szondát langyos ivóvízzel (körülbelül 37°C) a táplálás megkezdése előtt. Orális (íható) táplálás esetén a fogzászásra kész ítal lehúvna a legfontosab.

Tárolás: Száraz, hűvös helyen tartandó. Használat után mindig gondosan zárja vissza a fedelét. Felbontás után 1 hónapon belül felhasználandó. Védőgázos csomagolásban.

Összetevők: Növényi olajok (pálmaolaj, szójababolaj, napraforgóolaj), **tehenjtefehére** (kazein, tejsavó), szójalecetin, cellulóz, glükóz-szirup, inulin, kalcium-karbonát, kálium-klorid, oligofruktóza, gumiarabikum, trikálcium-foszfát, csomósodást gátló anyag (szilikium-dioxid), rezisztens keményítő, nátrium-klorid, kálium-citrát, kolin-bitarát, L-arginin, L-cisztin, olaj (Monterella Alpina-ból, olaj *Cryptocodinium cohnii*-ből, szója poliszacharid, magnézium-acetát, aroma, L-tryptofán, nátrium-kazeinát (**tehenjtejből**), nátrium L-aszorbát, maltodextrin, magnézium-oxid, L-fenilalanin, L-kamlin, L-aszorbinsav, taurin, vas-szulfát, L-valin, inozitol, L-tirozin, edesítőszer (szukralóz), emulgeálószer (zsírsavak mono és

L-arginin, L-Cystin, Ól as Monterella alpina, Ól as *Cryptocodinium cohnii*, Soja-Polysaccharide, Magnesiumacetat, Aroma, L-Tryptophan, Natriumcasein (aus Kuhmilch), Natrium-L-ascorbat, Maltodextrin, Magnesiumoxid, L-Phenylalanin, L-Camitin, L-Ascorbinsäure, Taurin, Eisensulfat, L-Valin, Inositol, L-Tyrosin, Süßholzwurzel (Suralose), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Zink-sulfat, DL-α-Tocopherylacetat, Niotinamid, Calcium-D-Pantothemat, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Mangansulfat, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, gemischte Tocopherole), Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Chrom(III)-chlorid, Natriumselenit, Natriummolibdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.

Figyelmeztetés: Kérjük, kövesse figyelemmel a betegét hipoglycemia, vesebő, hiperlipidémia valamint a megfelelő növekedés tekintetében.

Javaslat adogatás: A napi mennyiséget és a higítás mértékét orvosnak vagy dietetikusnak kell megállapítania, az a mennyiség függ az a beteg életkorától, a testtölyétől és egészségi állapotától.
Javasolt higítás: 14,2 fertogat.% (pl.: 14,2 g por + 86 ml víz/12 = 100 ml elkészített oldat)
Az orvos az egyéni igények alapján magasabb koncentrációkat is előírhat.

Kerjeje össze a következő mennyiségeket a megfelelő koncentráció eléréséhez.

Higítás	Por	Ívóvíz	Elkészített mennyiség	Ozmolálítás
0,67 kcal/ml	95 g	91 ml	100 ml	110 mOsmol/kg H ₂ O
0,8 kcal/ml	114 g	89 ml	100 ml	130 mOsmol/kg H ₂ O
1,0 kcal/ml	142 g	86 ml	100 ml	170 mOsmol/kg H ₂ O
1,5 kcal/ml	21,3 g	79 ml	100 ml	260 mOsmol/kg H ₂ O

A ketogén diéta kezdetén, a magas zsírtartalom tolerálhatósága miatt, kevésbé koncentrárt vagy kisebb mennyiségű speciális élelmiszer bevitele lehet szükséges. Figyeljen arra, hogy a napi szükséges folyadékbevitel biztosított legyen.

Használati utasítás: Szonda - és íható tápláláshoz:

- Öntsze a megfelelő mennyiségű meleg vizet egy csavars fedélrel zárható edénybe. A port meleg vízzel (45-50°C) kell elkészíteni, hogy teljesen feloldódjon. Hőmérvével ellenőrizze a hőmérsékletet vagy 1:1 arányban keverjen össze frissen forrárt vizet hideg ivóvízzel a megfelelő hőmérséklet eléréséhez (közvetlenül ne használjon foró vizet a csapból).
- Mérje ki a szükséges mennyiségű port.
- Zárja le az edényt és addig rázza erősen, amíg teljesen feloldódik.
- Óvatosan távolítsa el a doboz fedelét. Igény esetén hűtse le hűtőszekrényben és 24 órán belül fogyassza el az elkészített oldatot.