

TYR Anamix Infant speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer. Felhasználható igazolt tirozinémia diétás ellátására normál plazma metionin szint esetén csecsemők részére a születéstől 12 hónapos korig és kiegészítő táplálásra 3 éves korig. Aminosav alapú, tirozin-, és fenilalaninmentes por esszenciális és nem esszenciális aminosav, szénhidrát, zsír, vitamin, ásványi anyag és nyomelem tartalommal **Nettó tömeg: 3x400 g.** **Fontos figyelmeztetések:** Csak szoros orvosi felügyelet mellett alkalmazható, parentálisan nem alkalmazható. Felhasználható csecsemőknél és kisgyermek kiegészítő táplálására. Kizárólagos fehérjeforrásként nem adható, javasolt más fehérjeforrással együtt adni, pl. anyatejjel, csecsemő tápszerrel vagy más fehérjeforrással, hogy a csecsemő/gyermek tirozin, fenilalanin, folyadék és általános tápanyagszükségletét a szakorvos vagy dietetikus javaslatának megfelelő mennyiségben fedezze. **Adagolás:** a mennyiséget és a hígítás mértékét az orvosnak és a dietetikusnak kell megállapítania, amely függ a beteg életkorától, testtömegétől és az egészségi állapotától. **Javasolt koncentráció:** Minden csapott adagolókanálnyi (5 g) porhoz 30 ml víz szükséges a javasolt koncentráció eléréséhez (15 % w/v, pl. 15 g por 100 ml-ig vízzel felöntve) ahol az ozmolalitás: 380 mOsmol/kg víz. **Elkészítés:** A CSECSEMŐ EGÉSZSÉGE FÜGG AZ ELŐKÉSZÍTÉSRE ÉS ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK PONTOS BETARTÁSÁTÓL. A HELYTELEN ELKÉSZÍTÉS ÁRTHAT A CSECSEMŐ EGÉSZSÉGÉNEK. 1. Az elkészítés előtt mosson kezét és tisztítsa meg a környezetét. Sterilizálja a cumisüveget és a cumit. 2. Forraljon friss vizet 5 percig, vagy amíg az elektromos forraló ki nem kapcsol, majd hagyja hűlni legalább 30 percig, amíg a csuklóján még melegnek érzi. A szükséges mennyiségű vizet töltsen a sterilizált cumisüvegbe. 3. Az adagolókanállal mértesen a porból, majd egy tiszta, száraz késsel simítsa le a kanál tetejét. Ne tömörítse az adagolókanálba a port. Csak a termékben található adagolókanál használható fel az elkészítéshez. 4. Adja a szükséges mennyiségű port a vízhez. Tegye vissza a cumisüveg tetejét, majd rázza, amíg a por fel nem oldódik. Az etetés előtt győződjön meg róla, hogy az elkészített oldat hőmérséklete megfelelő, tegyen pár cseppet a csuklójára. 5. Közvetlen elkészítés után használja fel. A cumisüvegben megmaradt, elkészített oldatot az etetés után 1 órával dobja ki. Ne melegítse újra az etetés alatt. Fontos figyelmeztetés: A por nem steril. Az etetés előtt mindig frissen készítse el az oldatot. Ne forralja és ne használjon mikrohullámú sütőt az elkészítéséhez vagy melegítéséhez. **Kérjük, hogy vigyázzon gyermeke fogainak egészségére!** Cumisüveggel történő etetés esetén ne hagyja, hogy az üveg hosszú ideig vagy gyakran érintkezzen a csecsemő vagy a kisgyermek fogzatával, mivel ezzel növelheti a fogbetegségek kialakulásának kockázatát. Győződjön meg róla, hogy gyermekének fogai meg lettek tisztítva az esti etetés után. Kérdéseivel, tanácsért forduljon fogorvosához. **Összetevők:** szárított glükózszirup, növényi olajok (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj, kókuszolaj, repcemagolaj, napraforgó olaj), galakto-oligoszacharidok (**tehéntejből**), L-lizin-L glutamát, L-leucin, L-prolin, L-arginin, L-valin, L-izoleucin, glicin, emulgeálószer (zsírsavak mono és diszacharidjainak citromsav észterei), L-aszparaginsav, kalcium-foszfát, L-treonin, L-szerin, L-alanin, L-hisztidin, kálium-citrát, fruktooligoszacharid, kálium-klorid, L-cisztin, kolin-bitartarát, L-triptofán, magnézium-acetát, kalcium-glicerofoszfát, nátrium-hidrogén-foszfát, L-metionin, olaj Crypthecodium cohnii-ból, olaj Mortierella alpina-ból, nátrium-klorid, L-glutamin, inozitol, L-glutaminsav, L-aszkorbinsav, antioxidánsok (napraforgó lecitin, aszkorbil-palmitát), taurin, vas-szulfát, cink-szulfát, L-kamitin, DL- α -tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, nikotinamid, réz-szulfát, tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, retinil-acetát, kálium-jodid, mangán-szulfát, pteroilmonoglutaminsav, króm-klorid, fitomenadion, nátrium-selenit, nátrium-molibdát, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin. **Átlagos tápérték:** 100 g porban (100 ml 15%w/v-os kész oldatban) **Energia:** 1950 kJ/466 kcal (293 kJ/70 kcal), **Zsír** 23g (3,5 g), amelyből telített zsírsavak 7,7 g (1,2 g), egyszerűen telítetlen zsírsavak 11,3 g (1,7 g), többszörösen telítetlen zsírsavak 4,0 g (0,6 g), amelyből linolsav 3,21 g (481 mg), α -linolénsav 0,32 g (47,6 mg), arachidonsav 0,12 g (17,8 mg), dokozahexaénsav 0,12 g (17,8 mg), **Szénhidrát** 50,1 g (7,5 g) amelyből cukrok 7,5 g (1,1 g), **Rost** 3,7 g (0,56 g), **Fehérje ekvivalens** 13,1 g (2,0 g), amelyből L-alanin 0,68 g (102 mg), L-arginin 1,19 g (179 mg), L-aszparaginsav 1,00 g (150 mg), L-cisztin 0,45 g (67,5 mg), L-glutaminsav 1,34 g (201 mg), L-glutamin 0,13 g (19,5 mg), Glicin 1,07 g (161 mg), L-hisztidin 0,68 g (102 mg), L-izoleucin 1,07 g (161 mg), L-leucin 1,83 g (275 mg), L-lizin 1,24 g (186 mg), L-metionin 0,29 g (43,5 mg), L-fenilalanin - g* (- mg*), L-prolin 1,30 g (195 mg), L-szerin 0,80 g (120 mg), L-treonin 0,89 g (134 mg), L- triptofán 0,36 g (54,0 mg), L-tirozin, - g* (- mg*), L-valin 1,17 g (176 mg), **Só** 0,48 g (0,07 g), **Vitaminok:** A-vitamin 408 μ g (61,2 μ g), D-vitamin 11,2 μ g (1,68 μ g), E-vitamin 9,23 mg TE, 11,5 mg (1,38 mg TE, 1,73 mg), C- vitamin 48,9 mg (7,34 mg), K-vitamin 37,3 μ g (5,59 μ g), Tiamin 0,51 mg (0,08 mg), Riboflavin 0,51 mg (0,08 mg), Niacin 8,00 mg NE, 2,33 mg (1,20 mg NE, 0,35 mg), B6-vitamin 0,51 mg (0,08 mg), Folsav 55,0 μ g (8,25 μ g), Folát 91,7 μ g (13,8 μ g), B12-vitamin 1,21 μ g (0,18 μ g), Biotin 18,2 μ g (2,73 μ g), Pantoténsav 2,81 mg (0,42 mg), **Ásványi anyagok és nyomelemek:** Nátrium 191 mg (28,7 mg), Kálium 505 mg (75,8 mg), Klorid 355 mg (53,3 mg), Kalcium 410 mg (61,5 mg), Foszfor 300 mg (45,0 mg), Magnézium 58,3mg (8,75 mg), Vas 7,92 mg (1,19 mg), Réz 0,42 mg (0,063 mg), Cink 5,59 mg (0,84 mg), Mangán 0,029 mg (0,004 mg), Jód 97,9 μ g (14,7 μ g), Molibdén 12,1 μ g (1,82 μ g), Szelen 17,7 μ g (2,66 μ g), Króm 14,0 μ g (2,10 μ g), Egyéb: L-kamitin 10,1 mg (1,52 mg), Taurin 30,0 g (4,50 mg), Kolin 146 mg (21,9 mg), Inozitol 97,9 mg (14,7 mg). * nincs hozzáadva. **Tárolás:** Száraz, hűvös helyen tartandó. Felbontás után a doboz tetejét mindig szorosan zárja vissza, felbontás után két hétig használható fel. Védőgáz csomagolásban. **Minőségét megőrzi:** a doboz oldalán látható. Gyártás helye: Egyesült Királyság, SHS International Ltd., Forgalmazza: **Danone Kft.** 1134 Budapest, Váci út 35. www.nutricia.hu Infóvonal: 06 80 223 223



Címke kód: HU646546/06/07/2024 5 016533 655667