

**UCD Anamix Infant ízesítetlen speciális gyógyászati célra szánt ételiszter.** Felhasználható igazolt urea ciklus zavarában; hiperammóniemia-hiperornitinémia-homocitullinémia (HHH) szindrómában, valamint érhártya elfajulásban szenvedő csecsemők diétás ellátására, születéstől 12 hónapos korig, kiegészítő táplálékként 3 éves korig. Aminosav alapú por esszenciális aminosavakkal (emelt mennyiségű elágazó lánccu aminosavakkal (BCAA)), szénhidráttal, zsírral, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.

### **Nettó tömeg: 6x400 g**

**Fontos figyelmeztetések:** Csak orvosi felügyelet mellett alkalmazható, parenterálisan nem alkalmazható. Kizárólagos táplálásra nem alkalmas. Felhasználható csecsemőknél és kisgyermekek kiegészítő táplálására. Kizárólag igazolt urea ciklus zavarában, HHH szindrómában, valamint érhártya elfajulásban használható. Kizárólagos fehérje forrásként nem alkalmazható, az orvos vagy dietetikus által előírt fehérje forrásokkal (pl. anyatej, anyatej helyettesítő tápszer) együtt fedezi a csecsemő folyadék és általános tápanyagszükségletét. A napi mennyiséget és a hígítás mértékét orvosnak vagy dietetikusnak kell megállapítania, amely függ az életkortól, a testtömegetől és a beteg egészségi állapotától. Ajánlott hígítás: Minden egyes kanálhoz (5 g) 30 ml ivóvíz szükséges a javasolt koncentráció eléréséhez (15 w/v%: 15 g por vízzel való hígítása 100 ml-re). Ozmolalitása 15 w/v-os hígítás esetén 310 mOsmol/kg víz. **Elkészítés:** A következő elkészítési és használati utasításoktól való eltérés a csecsemő egészségét veszélyeztetheti. 1. Az elkészítés előtt mosson kezet és tisztítsa meg a környezetét. Sterilizálja a cumisüveget és a cumit. 2. Forraljon friss vizet 5 percig, vagy ameddig az elektromos forraló kikapcsol, majd hagyja hűlni legalább 30 percig, amíg a csuklóján még melegnek érzi. A szükséges mennyiségű vizet töltsse a sterilizált cumisüvegbe. 3. A mellékelt adagolókanállal mérítsen a porból, majd egy tiszta, száraz késsel simítsa le a kanál tetejét. Ne nyomkodja az adagolókanálba a port. Csak a termékben található adagolókanál használható fel az elkészítéshez. 4. Adja a szükséges mennyiségű port a vízhez. Tegye vissza a cumisüveg tetejét, majd rázza, amíg a por fel nem oldódik. Az etetés előtt győződjön meg róla, hogy az elkészített oldat hőmérséklete megfelelő, tegyen pár cseppet a csuklójára. 5. A cumisüvegben megmaradt, elkészített oldatot az etetés után 1 órával dobja ki. Ne melegítse újra az elkészített oldatot az etetés alatt. **Fontos figyelmeztetés:** A por nem steril. Az etetés előtt mindig frissen készítse el az oldatot. Ne forralja és ne használjon mikrohullámú sütőt az elkészítéséhez. **Kérjük, hogy vigyázzon gyermeke fogainak egészségére!** Cumisüveggel történő etetés esetén ne hagyja, hogy az üveg hosszú ideig vagy gyakran érintkezzen a csecsemő vagy a kisgyermek fogzatával, mivel ezzel növelheti a fogbetegségek kialakulásának kockázatát. Győződjön meg róla, hogy gyermekének fogai meg lettek tisztítva az esti etetés után. Kérdéseivel, tanácsért forduljon fogorvosához.

**Tárolás:** Száraz, hűvös helyen tartandó. Felbontás után a doboz tetejét mindig szorosan zárja vissza, felbontás után **két hétig** használható fel. Védőgázcsomagolásban. **Minőségét megőrzi:** a doboz oldalán látható. **Összetevők:** glükóz szirup, növényi olajok (magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, kókuszolaj, repcemagolaj, napraforgóolaj), L-leucin, kálium-citrát, kalcium-foszfát, L-lizin-hidroklorid, L-valin, L-izoleucin, emulgeálószer (zsírsavak citromsavészterinek mono és diszaharidjai), L-treonin, L-tirozin, magnézium-acetát, kolin-bitartarát, nátrium-klorid, L-fenilalanin, nátrium-hidrogén-foszfát, kalcium-glicerofoszfát, L-hisztidin, L-triptofán, olaj Crypthecodinium cohnii-ből, L-cisztin, L-metionin, olaj Mortierella alpina-ból, szacharóz, inozitol, L-aszkorbinsav, antioxidánsok (napraforgólecitin, aszkorbil-palmitát), taurin, vas-szulfát, cink-szulfát, L-kamitin, DL- $\alpha$ -tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, nikotinamid, réz-szulfát, tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, retinil-acetát, kálium-jodid, mangán-szulfát, pteroilmonoglutaminsav, króm-klorid, fitomenadion, nátrium-szelenit, nátrium-molibdát, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin. Átlagos tápérték: 100 g porban (100 ml 15%w/v-os kész oldatban) Energia:2058 kJ/309 kcal (492 kJ/74 kcal), Zsír 26,4g (4,0 g), amelyből telített zsírsavak 10,5 g (1,6 g), egyszerűen telítetlen zsírsavak 11,7 g (1,8 g), többszörösen telítetlen zsírsavak 4,3 g (0,64 g), amelyből linolsav 3,44 g (516 mg),  $\alpha$ -linolénsav 0,35 g (52,0 mg), arachidonsav 0,13 g (18,8 mg), dokozahexaénsav 0,13 g (18,8 mg), Szénhidrát 56,5 g (8,5 g) amelyből cukrok 5,2 g (0,78 g), Rost 0 g (0 g), Fehérje ekvivalens 7,5 g (1,1 g), amelyből L-cisztin 0,27 g (40,5 mg), L-hisztidin 0,32 g (47,7 mg), L-isoleucin 1,40 g (210 mg), L-leucin 2,40 g (360 mg), L-lizin 1,20 g (180 mg), L-metionin 0,25 g (37,3 mg), L-fenilalanin 0,42 g (62,8 mg), L-treonin 0,99 g (148 mg), L-triptofán 0,30 g (44,7 mg), L-tirozin 0,77 g (115 mg), L-valin 1,40 g (210 mg), Só 0,74 g (0,11 g), Vitaminok: A-vitamin 431  $\mu$ g (64,7  $\mu$ g RE), D-vitamin 11,8  $\mu$ g (1,77  $\mu$ g), E-vitamin 11,7 mg TE, 13,2 mg (1,76 mg TE, 1,99 mg), C- vitamin 51,5 mg (7,73 mg), K-vitamin 40,0  $\mu$ g (6,00  $\mu$ g), Tiamin 0,54 mg (0,08 mg), Riboflavin 0,54 mg (0,08 mg), Niacin 7,47 mg NE, 2,50 mg (1,12 mg NE, 0,38 mg), B6-vitamin 0,54 mg (0,08 mg), Folsav 58,1  $\mu$ g (8,72  $\mu$ g), B12-vitamin 1,30  $\mu$ g (0,20  $\mu$ g), Biotin 19,3  $\mu$ g (2,90  $\mu$ g), Pantoténsav 3,00 mg (0,45 mg), Ásványi anyagok és nyomelemek: Nátrium 295 mg (44,3 mg), Kálium 713 mg (107 mg), Klorid 530 mg (79,5 mg), Kalcium 670 mg (101 mg), Foszfor 442 mg (66,3 mg), Magnézium 73,0 mg (11,0 mg), Vas 8,70 mg (1,31 mg), Réz 0,45 mg (0,068 mg), Cink 6,1 mg (0,92 mg), Mangán 0,031 mg (0,005 mg), Jód 99,4  $\mu$ g (14,9  $\mu$ g), Molibdén 12,9  $\mu$ g (1,94  $\mu$ g), Szelén 18,7  $\mu$ g (2,81  $\mu$ g), Króm 14,8  $\mu$ g (2,22  $\mu$ g), Egyéb: L-kamitin 10,0 mg (1,50 mg), Taurin 40,0 g (6,00 mg), Kolin 154 mg (23,1 mg), Inozitol 104 mg (15,5 mg). Gyártja: SHS International Ltd. Egyesült Királyság, Forgalmazza: Danone Kft. 1134 Budapest, Váci út 35. www.nutricia.hu Infóvonal: 0680 223 223 Címke kód: HU146539/14/06/2024