



Nettó tömeg: 600 g e

► Először nyomd be, utána tépd fel!

TEJALAPÚ  
ANYATEJ-  
HELYETTESÍTŐ  
TÁPSZER



1  
0 HÓ+

Ingyenes Tanácsadás: 06 80 33 12 33

@milupa@milupa.hu

miluklub

www.milupa.hu

www.miluklub.hu

Kisbabád életének első hónapjában a kizárólagos anyatejes táplálás megadja mindazokat a szükséges tápanyagokat, amelyek a szervezet egészséges növekedéséhez és fejlődéséhez elengedhetetlenek. Ha bármilyen okból nem tudsz szoptatni, vagy az anyatej már nem elegendő, konzultálj gyermekorvosoddal a gyermeked táplálásával kapcsolatban. A Milupa tápszerrel továbbra is biztosíthatod kisbabád számára a napi szükséges tejalapú táplálékot.



- ✓ A Milupa termékek végigkövetik kisbabád táplálkozási igényeinek alakulását egészen 3 éves korig. A kiegyensúlyozott, változatos étrend részeként hozzájárulnak a fejlődéshez és növekedéshez szükséges tápanyagok beviteléhez.
- ✓ A Milupa termékeket a csecsemők tápanyagigényeinek figyelembevételével fejlesztettük ki.
- ✓ A Milupa személyreszabott támogatást nyújt Neked a szakértői tanácsadóvonalon keresztül.

Ez a doboz újrahasznosítható. Óvd a környezetet, helyezd a dobozt a szelektív hulladékgyűjtőbe!

TUDOD, MEKKORA KISBABÁD POCAKJA?



Haspók a fedélzeten?

Nem csak babád, de az étvágya is egyre nagyobb? Már ismerkedtek a kanállal? 6 hónapos kortól áttérhettek a Milupa 2 tápszerre.

Fontos figyelmeztetés!

- A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej, a legegészségesebb táplálási mód a szoptatás.
- Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, kérdezd meg a gyermekorvost, védőnőt a termék használatáról!
- A Milupa 1 tápszer orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható.
- Ne térd el az orvos előírásaitól, illetve a használati utasítástól, mert az zavart okozhat a kisbabád fejlődésében!

Adagolás:

A Milupa 1 tápszer standard hígítása:

1 lesimított adagolókanál = 4,5 g tápszerpor  
3 lesimított adagolókanál (13,5 g) tápszerpor + 90 ml ivóvíz = 100 ml kész tápszer

Életkor	Ajánlott tejalapú étkezések száma naponta	Kész tápszer	Adagolási javaslat	
			Ivóvíz (ml)	Adagolókanalak száma
1-2 hét	gyermekorvossal, védőnővel való megbeszélés alapján			
3-4 hét	6-7	100 ml	90	3
1-2 hónap	6	133 ml	120	4
3-4 hónap	5-6	167 ml	150	5
5-6 hónap	5-6	200 ml	180	6

A 6 hónapos koron túli ajánlott napi mennyiségről konzultálj gyermekorvossal vagy védőnővel!

Hasznos tanácsok a biztonságos használatához:

- A Milupa 1 tápszer 6 hónapos korig alkalmazható kizárólagos táplálékként.
- Minden étkezéshez frissen készítsd el a tápszert, és azonnal vagy legfeljebb 2 órán belül használd fel, a maradékot öntsd ki!
- Gondosan ügyelj a megfelelő hígításra, és ivóvíz minőségű vizet használj!
- A mellékelt adagolókanalat használd a tápszerpor kiméréséhez!
- Melegítéshez ne használj mikrohullámú sütőt a túlforrósodás veszélye miatt!
- Figyelj arra, hogy babád mindig felülről felüljele mellett legyen, illetve egyen, és etetés után gondoskodj a fogpólarórt!

A tápszer elkészítése

- 1 Moss kezet, forrásban lévő vízben fertőtlenítsd a cumisüveget, a cumit, és mindig tiszta adagolókanalat használj!
- 2 Forrald fel a megfelelő mennyiségű ivóvizet, majd hűtsd le kb. 40 °C-ra, és öntsd 1/3 részét a cumisüvegbe!
- 3 Mérd ki cumisüvegbe a tápszerport az adagolási táblázat szerint, majd zárd le, és rázd jól össze (kb. 20 másodpercig)!
- 4 Öntsd hozzá a maradék vizet, zárd le, majd óvatosan rázd össze újra!
- 5 Ellenőrizd a tápszeroldat hőmérsékletét (kb. 37°C)!

TEJALAPÚ ANYATEJ-  
HELYETTESÍTŐ TÁPSZER

0 HÓ+

1

90 EVES TAPASZTALAT  
Teljes értékű táplálék\*  
MILUPA MINŐSÉG

\*Az anyatej-helyettesítő tápszerekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Átlagos értékek  
100 ml tápszeroldatban (13,5 g por)

Energia	276 kJ	E-vitamin	1,2 mg TE
	66 kcal	K-vitamin	4,2 µg
Zsírok	3,4 g	C-vitamin	8,3 mg
amelyből:		Tiamin (B <sub>1</sub> )	0,07 mg
- telített zsírsav	1,1 g	Riboflavin (B <sub>2</sub> )	0,14 mg
- LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak)		Niacin (B <sub>3</sub> )	0,43 mg
-- Arachidonsav		Pantoténsav (B <sub>5</sub> )	0,61 mg
[AA]	16,5 mg	B <sub>6</sub> -vitamin	0,05 mg
-- Dokozahexaénsav		Folát	17 µg
[DHA]	16,5 mg	B <sub>12</sub> -vitamin	0,15 µg
Szénhidrátok	7,5 g	Biotin	2,1 µg
amelyből:		Ásványi anyagok	
- cukrok	7,4 g	Nátrium	21,4 mg
-- amelyből laktóz	7,29 g	Kálium	74 mg
inozit	7,7 mg	Klorid	52 mg
Élelmi rost	0,3 g	Kalcium	53 mg
amelyből:		Foszfor	39 mg
- GOS (Galakto-oligoszacharid)	0,24 g	Magnézium	6,6 mg
- FOS (Frukto-oligoszacharid)	0,04 g	Vas	0,53 mg
Fehérje	1,3 g	Cink	0,48 mg
amelyből:		Réz	0,05 mg
- tejsavó fehérje	0,8 g	Mangán	0,003 mg
- kazein	0,5 g	Fluorid	≤ 5,9 µg
Vitaminok		Szelen	2,5 µg
A-vitamin	58 µg	Jód	13 µg
D <sub>2</sub> -vitamin	1,45 µg	Egyéb	
		L-karnitin	2 mg
		Kolin	22 mg
		Taurin	0,15 mg

Összetevők: ✓

Laktóz (tejből), növényi olajok változó arányban (magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, kókuszoilaj, repceolaj, napraforgóolaj), sovány tej, demineralizált tejsavó, tejsavó koncentrátum, galacto-oligoszacharidok (tehéntejből), tejfehérje, halolaj, trikálcium-foszfát, frukto-oligoszacharidok, kálium-klorid, Mortierella alpina olaj, nátrium-citrát, kolin-klorid, magnézium-hidrogén-foszfát, kálium-citrát, L-askorbinsav, inozit, emulgeálószer (szójalecitin), magnézium-klorid, vas-szulfát, cink-szulfát, L-karnitin, antioxidáns (aszkorbil-palmitát), kalcium-D-pantotenát, nikotinamid, réz-szulfát, DL-alfa-tokoferil-acetát, retinil-palmitát, tiamin-hidroklorid, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroilmonoglutaminsav, kálium-jodid, mangán-szulfát, nátrium-szelenit, fitomenadiol, D-Biotin, kolekalciferol, cianokobalamin.  
Allergének: összetevőlistában kiemelve

Forgalmazza:  
Danone Kft.,  
1194 Budapest,  
Váci út 35.



600 g e  
(1 x 600 g)

10510774  
201655  
0121719-01-0001

00032000915\_v4 FB 140x72x193 GD2 400G



Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): ▲

A TERMÉKET GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TÁROLD!  
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI (NAP, HÓNAP, ÉV): A DOBOZON FELTÜNTETETT IDŐPONTIG.  
A MEGBONTOTT CSOMAGOT SZÁRAZ, HÜVÖS HELYEN (NEM HÜTŐBEN) KELL TÁROLNI (-25 °C) SZOROSAN VISSZAZÁRVA, ÉS NE HASZNÁLD 4 HÉTNEL TOVÁBBI VEDŐGÁZAS CSOMAGOLÁSBAN.

