01233201-01-0004

10521187

ÖSSZETEVŐK:

Glukózszirup, növényi olajok (pálma-, kókusz-, repce-, magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, napraforgóolaj), kalcium-kazeinát (**tej**ből), maltodextrin, kalcium-foszfát, nátrium-citrát, dikálium-hidrogén-foszfát, **hal**olaj, kálium-citrát, magnézium-klorid, kálium-klorid, L-cisztein, kolin-klorid, Mortierella alpina olaj, emulgeálószer (**szója**lecitin), L-aszkorbinsav, kálium-hidroxid, inozit, taurin, L-triptofán, L-karnitin, vas-szulfát, cink-szulfát, uridin-5'-monofoszfát nátriumsója, citidin-5'-monofoszfát, DL-alfa tokoferil-acetát, kalcium-D-pantotenát, adenozin-5'-monofoszfát, inozin-5'-monofoszfát nátriumsója, nikotinamid, guanozin-5'-monofoszfát nátriumsója, réz-szulfát, riboflavin, DL-alfa tokoferol, retinil-palmitát, tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, kálium-jodid, pteroilmonoglutaminsav, mangán-szulfát, nátrium-szelenit, fitomenadion, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin

Allergének: összetevőlistában kiemelve

Fontos figyelmeztetés!

- A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej, a legegészségesebb táplálási mód a szoptatás.
- Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, kérjénd meg a gyermekorvost, védőnőt a tápszer használatáról!
- Ne térj el az orvos előírásától, illetve a használati utasítástól, mert ez zavart okozhat a kisbabád fejlődésében!

Védőgázas csomagolásban. Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozra jelzett feltüntetett időpontig. Tárolás: száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, +25°C) szorosan visszazárva. A megbontott dobozt 4 hétnél tovább ne használd! A termék gyermekektől elzárva tárolandó.

TÁPANYAGTÁBLÁZAT

Átlagos értékek 100 ml tápszeroldatban (13,14 g por)			
Energia	276 kJ 66 kcal	Riboflavin (B2)	0,14 mg
Zsírok	3,4 g	Niacin (B3)	0,43 mg
amelyből:		Pantoténsav (B5)	0,528 mg
- telített zsírsav	1,5 g	B6-vitamin	0,046 mg
- LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak)		Folát	14 µg
-- Arachidonsav (AA)	17 mg	B12-vitamin	0,17 µg
-- Dokozahexénsav (DHA)	17 mg	Biotin	1,6 µg
Szénhidrátok	7,6 g	**Ásványi anyagok**	
amelyből:		Nátrium	22,1 mg
- cukrok	1,2 g	Kálium	80 mg
-- amelyből laktóz	<0,007 g	Klorid	51 mg
inozit	7,3 mg	Kalcium	68 mg
Élelmi rost	0 g	Foszfor	49 mg
Fehérje	1,3 g	Magnézium	5,6 mg
amelyből:		Vas	0,71 mg
- tejsavó fehérje	0 g	Cink	0,48 mg
- kazein	1,3 g	Réz	0,052 mg
Vitaminok		Mangán	0,007 mg
A-vitamin	58 µg-RE	Fluorid	≤5,9 µg
D3-vitamin	1,4 µg	Szelén	3 µg
E-vitamin	1,2 mg TE	Jód	15 µg
K-vitamin	4,4 µg	**Egyéb**	
C-vitamin	9,3 mg	L-karnitin	2,1 mg
Tiamin (B1)	0,07 mg	Kolin	22 mg
		Taurin	5,4 mg
		Nukleotidok	2,3 mg

Fordulj hozzánk bizalommal!

Ha kérdésed van kisgyermeked táplálásával, fejlődésével, vagy a Milumil® termékek használatával kapcsolatban, bátran hívd munkatársunkat!

06 80 33 12 33 — ingyenes zöldszám

milumil@milumil.hu — www.milumil.hu

NUTRICIA

Milumil®

LACTOSE FREE

*Speciális igényre szabott formula

Laktóz-mentes*

Pronutra

TEJALAPÚ, ANYATEJ-HELYETTESÍTŐ TÁPSZER
Újszülött kortól
✓ Laktózmentes*
✓ Teljes értékű táplálék**

400 g

**Az anyatej-helyettesítő tápszerekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Milumil® Lactose free

Standard hígítás: Mellékelt adagolókanál lesimítva ≈ 4,4 g tápszerpor 3 lesimított adagolókanál (13,14 g) tápszerpor + 90 ml ivóvíz = 100 ml kész tápszer

Életkor	Ajánlott tejalapú étkezések száma	Ivóvíz (ml)	Adagolókanalak száma	Kész tápszer
1-2 hét	gyermekorvossal, védőnővel való megbeszélés alapján			
3-4 hét	6-7	90	3	100 ml
1-2 hónap	6	120	4	133 ml
3-4 hónap	5-6	150	5	167 ml
5-6 hónap	5-6	180	6	200 ml
6-7 hónap	naponta 3-4x	180	6	200 ml
8-9 hónap	naponta 2-3x	210	7	233 ml
10-12 hónap	naponta 2x	240	8	267 ml

A tápszer elkészítése

1. Moss kezet, forrásban lévő vízben fertőtlenítsd a cumisüveget, a cumit és mindig tiszta adagolókanalat használj.

2. Forrald fel a szükséges mennyiségű ivóvizet, majd hűtsd le kb. 40°C-ra, és öntsd 1/3 részét a cumisüvegbe.

3. Mérd ki a cumisüvegbe a tápszerport (az adagolási táblázat szerint), zárd le és rázd jól össze (kb. 20 másodpercig).

4. Öntsd hozzá a maradék vizet, majd óvatosan rázd össze újra.

5. Ellenőrizd a tápszeroldat megfelelő hőmérsékletét (kb. 37°C).

NUTRICIA

EGYEDI SZAKÉRTELEM

A NUTRICIA tapasztalata a **csecsemőtáplálás** területén már 120 évnél is régebbre nyúlik vissza. Több mint 500 elkötelezett kutatónk és szakértőnk 50 éve élen jár a **kutatásban.**

Ez tette lehetővé, hogy létrehozzuk a **Milumil® Lactose free** anyatej-helyettesítő tápszerünket, egy teljes értékű tápanyagforrást, mely kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy hozzájáruljon kisbabád táplálkozási szükségleteinek biztosításához növekedésének minden szakaszában.

50 — év — kutatás

Válogatott összetevők egyedi keveréke

A **Milumil® Lactose free** tápszer nem alkalmazható galaktozémiában, vagy tehéntejfehérje-allergia esetén.

Gyermeked egészségének érdekében gondosan ügyelj a következőkre:

A Milumil® Lactose free tápszer 6 hónapos korig egyedüli táplálékforrásként, 6 hónapos kor után vegyes táplálékkal kiegészítve alkalmazható. • A tápszert minden étkezéshez frissen készítsd el, és 2 órán belül használd fel. • A melegítéshez ne használj mikrohullámú sütőt a túlmelegedés veszélye miatt. • Figyelj arra, hogy babád mindig fehlőtt felügyelete mellett igyon, illetve egyen, és etetés után gondoskodj a fogápolásról.

Forgalmazó: Danone Kft.
1134 Budapest, Váci út 35.

NL 20041 CE

8 718117 606580

400 g