

Tápérték információ / Prehrambena vrijednost	100 g	100 ml 13,5%-os higítás esetén / 100 ml 13,5% w/v
<b>Energija / Energija</b>	2065 kJ 493 kcal	279 kJ 67 kcal
<b>Zsir / Masti</b> (41 En%) amelyből / od kojih	25,6 g	3,5 g
- Telítet zsírsavak / zasićene masne kiseline	10,1 g	1,4 g
- Egyzseresen telítetlen zsírsavak / Mononezasićene masne kiseline	11,4 g	1,5 g
- Többzseresen telítetlen zsírsavak / polinezasićene masne kiseline amelyből / od kojih	4,1 g	0,56 g
-- Linolsav / linoleinska kiselina	3,33 g	450 mg
-- $\alpha$ -Linolensav / $\alpha$ -linolenska kiselina	0,33 g	44,5 mg
-- Arachidonsav / arahidonska kiselina (AA)	0,13 g	17,0 mg
-- Dokozahexaénsav / dokozahexanoinska kiselina (DHA)	0,12 g	16,7 mg
<b>Szénhidrát / Ugljikohidrati</b> (42 En%) amelyből / od kojih	52,7 g	7,1 g
- Cukrok / šećer	4,6 g	0,62 g
<b>Rost / Vlakna</b> (0 En%)	0 g	0 g
<b>Fehérje ekvivalens / Proteini</b> (11 En%)	13,3 g	1,8 g
<b>Só / Sol</b>	0,53 g	0,07 g
<b>Vitaminok / Vitamini</b>		
A-vitamin / Vitamin A	431 $\mu$ g	58,2 $\mu$ g
D-vitamin / Vitamin D	11,8 $\mu$ g	1,59 $\mu$ g
E-vitamin / Vitamin E (9,85 mg $\alpha$ -TE/ET)	11,0 mg (1,33 mg $\alpha$ -TE/ET)	1,49 mg
C-vitamin / Vitamin C	52,7 mg	7,11 mg
K-vitamin / Vitamin K	44,7 $\mu$ g	6,03 $\mu$ g

**HU** **Összetevők:** szántóföldi glükóz szirup, finomított növényi olajok (magas olajsav tartalmú napraforgóolaj, kókuszolaj olaj, repceolaj, napraforgó olaj), L-arginin-L-aszparát, L-leucin, L-lizin-acetát, L-glutamin, L-prolin, emulgeázószér (E-472c), L-valin, L-izoleucin, glicin, dikálium-hidrogénfoszfát, L-treonin, L-fenilalanin, L-tirozin, L-szerin, L-hisztidin, L-alanin, kálium-hidrogénfoszfát, trikálium-citrát, nátrium-citrát, nátrium-karbonát, L-cisztin, kolin-bitarát, kálium-glicerofoszfát, L-tryptofán, kálium-citrát, magnézium-klorid, L-metionin, trikálium-foszfát, olaj Morbierella alpina-ból, olaj Schizochytrium mikroalgából, magnézium-L-aszparát, inozitol, L-ascorbinas, antioxidáns (napraforgó lecitin és aszkorbil palmitát), taurin, vas-szulfát, cink-szulfát, L-karnitin, DL-alfa-tokoferil-acetát, undin 5-monofoszfát nátrium sója, citidin 5-monofoszfát, nikotinamid, kalcium-D-pantoténat, inozin 5-monofoszfát nátrium sója, adenozin 5-monofoszfát, guanozin 5-monofoszfát nátrium sója, réz-szulfát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin hidroklorid, retinil-acetát, kálium-jodid, mangán-szulfát, pteroil-monoglutaminsav, fitomenadion, nátrium-selenit, króm-klorid, nátrium-molibdát, D-biotin, kolekalkiferol, cianokobalamin.

**Gyártja:** SHS International Ltd, Wavertree Blvd. 100, Liverpool L7 9PT Egyesült Királyság  
**Neocate az SHS International Ltd birtokán gyártott termék. Forgalmazza:** Danone Kft. 1134 Budapest, Váci út. 35. www.nutricia.hu infonapló: 0680 223 223

Tápérték információ / Prehrambena vrijednost	100 g	100 ml 13,5%-os higítás esetén / 100 ml 13,5% w/v
<b>Tiamin</b>	0,59 mg	0,08 mg
<b>Riboflavin</b>	0,59 mg	0,08 mg
<b>Niacin</b> (9,41 mg NE/EN)	4,09 mg (1,27 mg NE/EN)	0,55 mg
<b>B<sub>6</sub>-vitamin / Vit. B<sub>6</sub></b>	0,48 mg	0,06 mg
<b>Folsav / Folna kiselina</b>	68,5 $\mu$ g	9,24 $\mu$ g
<b>Folát / Folati</b>	116 $\mu$ g	15,7 $\mu$ g
<b>B<sub>12</sub>-vitamin / Vitamin B<sub>12</sub></b>	1,38 $\mu$ g	0,19 $\mu$ g
<b>Biotin</b>	19,2 $\mu$ g	2,59 $\mu$ g
<b>Pantoténsav / Pantotenska kiselina</b>	3,05 mg	0,41 mg
<b>Ásványi anyagok és nyomelemek / Minerali i elementi u travogvima</b>		
<b>Na</b>	22 mg	2,8 mg
<b>K</b>	536 mg	72,4 mg
<b>Cl</b>	386 mg	52,1 mg
<b>Ca</b>	580 mg	78,3 mg
<b>P</b>	370 mg	49,9 mg
<b>Mg</b>	520 mg	70,2 mg
<b>Fe</b>	7,39 mg	1,00 mg
<b>Cu</b>	0,42 mg	0,057 mg
<b>Zn</b>	5,42 mg	0,73 mg
<b>Mn</b>	0,049 mg	0,007 mg
<b>In</b>	103 $\mu$ g	14,0 $\mu$ g
<b>Mo</b>	11,3 $\mu$ g	1,53 $\mu$ g
<b>Se</b>	18,7 $\mu$ g	2,53 $\mu$ g
<b>Sr</b>	10,8 $\mu$ g	1,46 $\mu$ g
<b>Egyéb / Ostalo</b>		
<b>L-karnitin</b>	10,8 mg	1,46 mg
<b>Kolin</b>	137 mg	18,5 mg
<b>Inozitol</b>	110 mg	14,9 mg
<b>Taurin</b>	32,0 mg	4,32 mg
<b>Nukleotid</b>	17,2 mg	2,0 mg
<b>Ozmolalitás / Osmolarnost</b>		310 mOsmol/l
<b>Ozmolalítás / Osmolalnost</b>		340 mOsmol/kg H <sub>2</sub> O

**HR** **Sastojci:** suhi glukozi sirup, rafinirana biljna ulja (visoko oleinsko sunokretovo ulje, kokosovo ulje, repičino ulje, sunokretovo ulje), L-arginin-L-aszparát, L-leucin, L-lizin-acetát, L-glutamin, L-prolin, emulgator (E-472c), L-valin, L-izoleucin, glicin, kalijev sili ortofosforne kiseline, L-treonin, L-fenilalanin, L-tirozin, L-serin, L-hisztidin, L-alanin, kalijev sili ortofosforne kiseline, kalijev citrat, natrijev klorid, kalijev karbonat, L-cistin, kolin bitartrat, kalijev glicerofosfat, L-tryptofan, kalijev citrat, magnezijev klorid, L-metionin, kalijev glicerofosfat, ulje dobiveno od gljive Morbierella alpina, ulje dobiveno od mikroalge Schizochytrium sp., magnezijev L-aszparát, inozitol, L-askorbinska kiselina, antioksidansi (sunokretov lecitin, L-askorbil 6-palmitat), taurin, željezov sulfat, cinkov sulfat, L-karnitin, DL- $\alpha$ -tokoferil acetat, undin 5-monofosfat natrijeve soli, citidin 5-monofosfat, nikotinamid, kalijev D-pantotemat, natrijeve soli inozin 5-monofosfata, adenozin 5-monofosfat, natrijeve soli gvanozin 5-monofosfata, bakreni sulfat, tiamin-mononitrat, riboflavin, piridoksin hidroklorid, retinil acetat, kalijev jodid, manganov sulfat, pteroilmonoglutaminska kiselina, fitomenadion, natrijev selenit, kromov (III) klorid, natrijev molibdat, D-biotin, kolekalkiferol, cianokobalamin.

**Proizvođač:** SHS International Ltd, 100 Wavertree Boulevard, Liverpool L7 9PT, Velika Britanija.  
**Neocate je registrirani zaštitni znak tvrtke SHS International Ltd. Distributer za Hrvatsku:** G-M Pharma Zagreb d.o.o. Velika cesta 74, 10020 Zagreb. Tel: 01/62234-053 www.g-mpharma.hr

# NUTRICIA Neocate® LCP

Hipoalergén

Aminosav alapú készítmény  
Tehéntejfehérje-allergia és többszörös  
táplálékallergiák diétás ellátására

\*További információk a doboz hátoldalán találhatók

Hipoalergeno

Na bazi aminokiselina  
Za dijetalnu prehranu kod teških  
alergija na kravlje mlijeko i  
višestrukih alergija na hranu\*

\*Pogledajte poleđinu pakiranja za punu indikaciju

SPECIÁLIS GYÓGYÁSZATI  
CÉLRA SZÁNT ÉLELMISZER  
TELJES ERTEKŰ TÁPLÁLÉK

HRANA ZA POSEBNE  
MEDICINSKE POTREBE  
NUTRITIVNO KOMPLETAN

400 g e

45

ÉV ALLERGIKUTATÁS  
GODINA ISTRAŽIVANJA  
NA POLJU ALERGIJA

**HU** Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer. \*Tehéntejfehérje-allergia és többszörös táplálékallergiák diétás ellátására, valamint olyan esetekben, amikor aminosav alapú készítmény adása javasolt.

**Fontos figyelmeztetés:** Kizárólag enterális táplálásra. Parenterálisan nem alkalmazható. Csak szoros orvosi felügyelet mellett használható, azután, hogy az összes lehetséges táplálási lehetőség alaposan át lett gondolt, beleértve az anyatejes táplálást is. Alkalmasság kizárólagos táplálásra egy éves kor alatt.

**Javasolt adagolás:** A napi mennyiség és a higítás mértékét orvosnak vagy dietetikusnak kell megállapítania; ez a mennyiség függ a beteg életkorától, testtömegétől és egészségi állapotától. **Javasolt koncentráció:** Egy csopott adagoláskor körülbelül 4,5 g port tesz ki. Adjon hozzá egy csopott adagoláskor port 30 ml vízhez a megfelelő koncentráció eléréséhez (13,5% w/v). Ozmolalítás a javasolt koncentráció (13,5 g por 100 ml-re vízvel hígítva) esetén 340 mOsmol/kg H<sub>2</sub>O.

Száraz, hűvös helyen tartandó. Használat után mindig gondosan zárja vissza a fedelet. Felbontás után 1 hónapon belül felhasználandó. Védőgázcsomagolásban.

**ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ: A CSESEMŐ EGÉSZSÉGE FÜGG AZ ELKÉSZÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK GONDOS BETARTÁSÁTÓL. A HELYTELEN ELKÉSZÍTÉS A CSESEMŐ MEGBETEGÉDESÉHEZ VEZETHET. Figyelmeztetés:** A por nem steril. Az etetés előtt mindig frissen készítsen el a csecsemőnek szánt speciális élelmiszert. Ne forralja az elkészített oldatot és ne használjon mikrohullámú sütőt az elkészítéséhez vagy melegítéséhez.

**Elkészítés:** 1. Alaposan mosson kezét és tisztítsa meg a környezetét. Sterilizálja a cumisüveget és a cumit. 2. Forraljon friss vizet 5 percre vagy amíg az elektromos forraló ki nem kapcsol. Hagyja hűlni 30 percre, amíg még melegnek érzi a csukóján. Öntse a megfelelő mennyiségű vizet steril cumisüvegbe. 3. A termékhez adott adagolókannal mérjen a porból és egy tiszta, száraz késsel simítsa le a felszínét. Ne nyomkodja az adagolókannába a port. Kizárólag a termékhez adott adagolókannát használja. 4. Adagolja az előírt mennyiségű port a vízhez. Tegye vissza az üveg tetejét, majd rázza, amíg a por fel nem oldódik. Etetés előtt győződjön meg róla, hogy az elkészített oldat hőmérséklete megfelelő, tegyen pár csepget a csukójára. 5. A cumisüvegben megmaradt, elkészített oldatot az etetés után 2 órával dobjja ki. Ne melegítse újra az elkészített oldatot az etetés alatt.

**Felhasználási útmutató:** A csecsemő igénye eltérhet az itt feltüntetett mennyiségektől, lehet az kevesebb vagy több. Amennyiben más élelmiszer bevezetésre kerülne az étrendbe, az kizárólag orvos, dietetikus felügyelete és irányítása mellett javasolt és a Neocate LCP megfelelő mennyiségének csökkentése lehet szükséges.

**Sajveti, preporuke i smjernice:** Dojenčad može zahtijevati veće ili manje količine od ovdje preporučene. Uvođenje dohrane uvijek treba biti po preporuci liječnika ili dječijetara. Količina Neocate LCP će se možda proporcionalno smanjivati zbog uvođenja dohrane.

**Kérjük, hogy vigyázzon gyermekének egészségére!** A dentálhigiénia fontos a csecsemőknél és gyermekeknél, mivel hosszán és tartósan érintkeznek a speciális élelmiszerek és más folyadékok a fogakkal, ami növeli a fogszavodás kockázatát. Győződjön meg róla, hogy az utolsó étkezés után a gyermek fogai meg vannak tisztítva.

**Upozorenja vezano za zdravlje zubica** Pravilna higijena zubi kod dojenčadi i djece je vrlo važna. Produžen ili čest kontakt zubi s hranom i napitcima povećava rizik od karijesa. Operite zube Vašeg djeteta nakon večere.

**Minőségét megőrzi:** lásd a doboz alján. / Najbolje upotrijebiti do: vidi na dnu limenke.

**HR** Hrana za posebne medicinske potrebe. \*Za dijetalnu prehranu kod teških alergija na kravlje mlijeko, višestrukih alergija na hranu i drugih stanja u kojima se preporučuje hrana na bazi aminokiselina. Od rođenja nadalje.

**Upozorenje:** Namijenjen samo za enteralnu uporabu. Nije za parenteralnu uporabu. Koristiti pod nadzorom doktora medicine nakon uzimanja u obzir svih mogućnosti hranjenja, uključujući dojenje. Prikladno kao jedini izvor prehrane za dojenčad mlađu od godinu dana.

**Preporučeni unos:** Količina hrane i razrjeđenje treba propisati isključivo liječnik ili dječijetar ovisno o dobi, tjelesnoj težini i zdravstvenom stanju pacijenta.

**Preporučena koncentracija:** Jedna razom napunjena mjerica sadrži otprilike 4,5 g. Dodati 1 mjericu praha na svakih 30 ml vode kako bi se postigla preporučena koncentracija (13,5% w/v). Osmolalnost pri toj koncentraciji (npr. 13,5 g Neocatea i 100 ml vode) iznosi 340 mOsmol/kg H<sub>2</sub>O.

Királhullámú sütővel előkészíthető / Dob djeteta	Királhullámú sütővel előkészíthető / Tiszta mész djeteta (vje)	Adagolókanna / Broj mjerica Neocate LCP	Lahított forrást v/á / Vrhazidna prokurana voda	Etetéshez szükséges mennyiség / Preporučeni broj obroka u 24 sata
5 hónap / 5 mjeseci	75 kg	7	200 ml	4-5

Övüvati na hladnom, suhom mjestu. Pazite da uvijek dobro zatvorite poklopac nakon svake upotrebe. Nakon otvaranja potrošiti u roku od mjesec dana. Pakirano u zaštitivoj atmosferi.

**UPUTE ZA HRANJENJE: ZDRAVLJE VAŠEG DJETETA OVISI O DOSLJEDNOM PRIDRŽAVANJU UPUTA ZA PRIJEMU I UPOTREBU. NEPRAVILNO KORIŠTENJE MOŽE NASTAVITI VAŠEM DJETETU.**

**Upozorenje:** hrana za dojenčad nije sterilna. Obrok pripremiti neposredno prije hranjenja.

**Ne zagrijavati do vrenja i ne koristiti mikrovalnu pećnicu za pripremanje obroka.**

**Priprema:** 1. Dobro operite ruke i očistite površinu za rad. Sterilizirajte bociću i sisac. 2. Prokuhajte vodu i ostavite ju da se malo ohladi. Provjerite temperaturu na ručnom zglobu. Propisanu količinu vode ulijte u steriliziranu bociću. 3. Napunite mjericu prahom Neocate LCP koja je priložena originalnom pakiranju te suhim i čistim nožem odstranite višak praha s mjerice. Ne pritiskajte prah u mjericu. Upotrijebite je samo priloženu mjericom. 4. Dodati propisani broj mjerica s Neocate LCP u vodu. Dobro zatvorite bociću i muckati dok se prah ne otopi. Na ručnom zglobu prije hranjenja provjeriti temperaturu pripravka. 5. Ostatak pripravka, koji stoji duže od 2 sata u bociću, treba baciti. Pripremljeni obrok ne smije podgrijavati.

2D

MAAT. NUMBER

EAN 100%  
(Min 85%)